

福島原発事故に関連して、ヨウ素を含む製剤や食品を摂取することを勧める、誤った情報が流れています。本来、予防のための内服は、行政の指示に従って決められた地域の人がすべきものです。誤った情報に対して、独立行政法人放射線医学総合研究所から、注意文が発出されました。皆様におかれましては、以下の引用文書をご参照いただき、独自の判断でのヨードを含む製剤や食品の大量摂取はくれぐれも控えるよう、ご注意ください。

(以下、引用)

ヨウ素を含む消毒剤などを飲んではいけません

-インターネット等に流れている根拠のない情報に注意-

平成 23 年 3 月 14 日(月)
独立行政法人 放射線医学総合研究所

放射性ヨウ素が大量に体の中に入った場合、健康への影響を低減するために、内服薬である『安定ヨウ素剤』を医師が処方する場合があります。

市販品としてヨウ素を含んだものはたくさんあります。ヨードチンキ、うがい薬、のどスプレー、消毒用せっけん、ルゴール液などです。これらを内服薬である『安定ヨウ素剤』の代わりに飲むのは絶対にやめてください。

理由は以下のとおりです。

- ・ うがい薬などの市販品は内服薬ではありません。これにはヨウ素以外の成分が多く含まれ、体に有害な作用を及ぼす可能性のある物質も含まれます。
- ・ たとえ飲んだとしても、ヨウ素含有量が少なく、放射性ヨウ素が集まるのを抑制する効果がありません。

わかめ等の海藻にもヨウ素が含まれますが、これらも効果がありません。

- ・ 含まれる安定ヨウ素が一定ではなく、十分な効果を得られるかは不明です。
- ・ コンブなどは良く噛まなければならない、消化過程が必要であり、吸収までの時間がかかります。

以上のことから、消毒剤やうがい薬などのヨウ素を含んだ市販品は、『安定ヨウ素剤』の代わりに飲んではいけません。また海藻等を食べても十分な効果はありません。

『安定ヨウ素剤』を医師が処方するものです。原子力災害などの緊急時に、指定された避難所などで服用指示があった場合のみ、服用してください。

(引用終わり)