

× 授乳中に使用してはいけない薬剤の代表例

2007.12 (1/1 ページ)

以下の薬剤は、通常、授乳中には使用できない薬剤の代表例です。授乳中に使用してはいけない薬剤をすべて網羅したものではありませんので、その点に十分ご注意ください。なお、薬剤の成分名がわからない場合には、医薬品医療機器総合機構のホームページを参照してください。

成分名	代表的な商品名	分類
アミオダロン	アンカロン	強心薬、抗不整脈薬、抗狭心症薬
エルゴタミン	カフェルゴット	片頭痛治療薬
カベルゴリン	カバサール	抗パーキンソン病薬
コカイン	コカイン	麻薬
シクロホスファミド	エンドキサソ	抗がん剤
シスプラチン	ランダ	抗がん剤
ジドブジン	レトロビル	抗ウイルス薬
ダナゾール	ボンゾール	排卵誘発薬、子宮内膜症治療薬、切迫流・早産治療薬
タモキシフェン	ノルバデックス	抗がん剤
ダントロレン	ダントリウム	抗めまい薬、筋緊張緩和薬、食欲抑制薬
ドキシソルピシン	アドリアシン	抗がん剤
ネビラピン	ピラミューン	抗ウイルス薬
パクリタキセル	タキソール	抗がん剤
バルガンシクロビル	バリキサ	抗ウイルス薬
ヒドロキシカルバミド	ハイドレア	抗がん剤
ブスルファン	マブリン	抗がん剤
フルオロウラシル	5FU	抗がん剤
プロモクリプチン	パーロデル	抗パーキンソン病薬
ミコフェノール酸モフェチル	セルセプト	抗リウマチ薬、免疫抑制薬
ミトキサントロン	ノバントロン	抗がん剤
メトトレキサート	メソトレキサート	抗がん剤
メトロニダゾール	フラジール	抗真菌薬、抗原虫薬、駆虫薬
モルヒネ	モルヒネ	麻薬
ラミブジン	エピビル	抗ウイルス薬