

備考	薬品名	成分名	限定	区分	ハイリスク薬
	BCGワクチン(経皮1人用)注	ワクチン	—	劇	
	EDTA-2Na点眼液(0.01M・5mL/瓶)		限		
	EOB・ブ [®] リヒ [®] スト注シリンジ (5mL/筒)	ガ [®] ト [®] キセト酸ナトリウムキット	—		
	GHRP(100 μg/瓶)注	塩酸ブ [®] ラルモレリン	—		
	HMG注用【150単位/瓶】「アスカ」	ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン注射用	—		
【禁注】	KCL注(1mEq/mL・20mL/管)	エンカリウム	—		Hi
【禁注】	KCL注【キット】(1mEq/mL・20mL/筒)	エンカリウム	—		Hi
	LH-RH(0.1mg/1mL/管)注	ゴ [®] ナド [®] レリン	—		
	Omegaven注(100mL/瓶)		限		
	TRH(0.5mg/1mL/管)注	ブ [®] ロチレリン	—		
【化療】	ア [®] ウイナーゼ [®] (10000U/瓶)筋注用	クリサンタスバ [®] ーゼ	限	劇	Hi
	ア [®] トセレブ [®] 脳脊髄手術用洗浄灌流液(500mL/キット)	ア [®] トセレブ [®] 脳脊髄手術用洗浄灌流液	—		
【化療】	ア [®] ビ [®] タックス(100mg/20mL/瓶)注	セツキシマブ [®]	限	劇	Hi
	ア [®] リ [®] ア硝子体内注射液(40mg/mL)<バ [®] イアル>	ア [®] リハ [®] ルセプト	限	劇	
	ア [®] ウト [®] ラザ [®] イム(2.9mg/5mL/瓶)注	ラ [®] ロニダ [®] ーゼ [®] (遺伝子組み換え)	限		
	ア [®] ガ [®] ルンダ [®] ーゼ [®] ヘ [®] ータBS(35mg/7mL/瓶)点滴注	ア [®] ガ [®] ルンダ [®] ーゼ [®] ヘ [®] ータ後続1	限	劇	
	ア [®] ガ [®] ルンダ [®] ーゼ [®] ヘ [®] ータBS(5mg/1mL/瓶)点滴注	ア [®] ガ [®] ルンダ [®] ーゼ [®] ヘ [®] ータ後続1	限	劇	
	ア [®] キネトン(5mg/1mL/管)注	ビ [®] ヘ [®] リデ [®] ン	—	劇	
	ア [®] キノリン草花粉 Algスクラッチ注	アレルゲ [®] ン	—		
	ア [®] クチバ [®] シン(600万U/瓶)注	アルテプ [®] ラーゼ [®]	限		
	ア [®] クテムラ [®] (200mg/10mL/瓶)注	ト [®] シリス [®] マブ [®] (遺伝子組換え)	—	劇	Hi
	ア [®] クテムラ [®] (80mg/4mL/瓶)注	ト [®] シリス [®] マブ [®] (遺伝子組換え)	—	劇	Hi
	ア [®] クテムラ [®] 注(162mg/0.9mL/キット)オートインジ [®] ェクター	ト [®] シリス [®] マブ [®]	限	劇	Hi
	ア [®] クトヒブ [®] (0.5mL/瓶)注	ワクチン	—	劇	
	ア [®] コアラ [®] ン(1800U/瓶)注	アンチトロンビ [®] ンガ [®] ンマ(遺伝子組換え)	限		
	ア [®] コアラ [®] ン(600U/瓶)注	アンチトロンビ [®] ンガ [®] ンマ (遺伝子組換え)	限		
	ア [®] ザ [®] クタム(1000mg/瓶)注	ア [®] ズ [®] トレオナム	限		
	ア [®] サリ Algスクラッチ注	アレルゲ [®] ン	—		
	ア [®] シアロシンチ注185		—		
	ア [®] シクロ [®] ピ [®] ル点滴静注用(250mg/瓶)	ア [®] シクロ [®] ピ [®] ル点滴静注用(250mg/瓶)「サ	限		
	ア [®] シクロ [®] ピ [®] ル点滴注(250mg/100mL/袋)	ア [®] シクロ [®] ピ [®] ルキット	—		
	ア [®] スコルビ [®] ン酸VitC <500mg/2mL/管>注	ア [®] スコルビ [®] ン酸	—		
	ア [®] スペ [®] ルギ [®] ルス Algスクラッチ注	アレルゲ [®] ン	—		
	ア [®] セリオ(1000mg/100mL/袋)注	ア [®] セトアミノフェン	—	劇	
	ア [®] セレント [®] (100 μg/2mL/瓶)注	ア [®] セレンサンナトリウム	—	劇	
	ア [®] タラックスP(25mg/1mL/管)注	ヒド [®] ロキシジ [®] ン	—		
【レジメン】	ア [®] タラックスP(25mg/1mL/管)注	ヒド [®] ロキシジ [®] ン	—		
	ア [®] タラックスP(50mg/1mL/管)注	ヒド [®] ロキシジ [®] ン	—		

備考	薬品名	成分名	限定	区分	ハイリスク薬
【レジメン】	アタラックスP(50mg/1mL/管)注	ヒドロキシゾン	—		
	アダリムマブ BS皮下注 [®] (40mg/0.4mL/キット)CTNK	アダリムマブ [®]	—	劇	Hi
	アディノヘーイ静注用(1000単位/キット)注	ルリオクトコグ アルファヘーコール	限		
	アディノヘーイ静注用(1500単位/キット)注	ルリオクトコグ アルファヘーコール	限		
	アディノヘーイ静注用(2000単位/キット)注	ルリオクトコグ アルファヘーコール	限		
	アディノヘーイ静注用(3000単位/キット)注	ルリオクトコグ アルファヘーコール	限		
	アデノシン負荷用静注シリンジ (60mg/20mL/筒)	アデノシン	—		
	アデホスLコー7(10mg/2mL/管)注	アデノシンサンリンサンニナ	—		
【免疫】	アトガム点滴静注(250mg/5mL/管)	抗ヒト胸腺細胞ウマ免疫グロブリン	限	劇	Hi
	アドステロール-I131注37		—		
【化療】	アドセトリス(50mg/瓶)注	ブレンツキシマブ ペドチン	限	劇	Hi
	アドナ(25mg/5mL/管)注	カルバゾクロムスルホナ	—		
	アドナ(50mg/10mL/管)注	カルバゾクロムスルホン酸Na	—		
	アドニO(5U/1mL/管)注	オキシトシン	—		
	アドヘーイ静注用(1000単位/キット)	ルリオクトコグ アルファ(遺伝子組換え)キット	限		
	アドヘーイ静注用(1500単位/キット)注	ルリオクトコグ アルファ	限		
	アドヘーイ静注用(2000単位/キット)注	ルリオクトコグ アルファ	限		
	アドヘーイ静注用(250単位/キット)	ルリオクトコグ アルファ(遺伝子組換え)	限		
	アドヘーイ静注用(500単位/キット)	ルリオクトコグ アルファ(遺伝子組換え)キット	限		
	アドレナリン(エピネフリン)(1mg/1mL/筒)注	アドレナリン	—	劇	Hi
	アドレナリン注10倍希釈液(5mg/50mL/瓶)	エピネフリン	—	劇	
	アドロビン硫酸塩(0.5mg/1mL/管)注	アドロビン	—	劇	
【特生】	アサクトC(献血)(2500U/瓶)注	人活性化ブドウ糖C	限		
	アサヘーイン(10mg/mL・20mL/管)注	ロビハカイン塩酸塩水和物注射液	—	劇	Hi
	アサヘーイン(2mg/mL・100mL/袋)注	ロビハカイン	—	劇	Hi
	アサヘーイン(2mg/mL・10mL/管)注	ロビハカイン	—	劇	Hi
	アサヘーイン(7.5mg/mL・20mL/管)注	ロビハカイン塩酸塩	—	劇	Hi
	アネマトロ(500mg/100mL/瓶)注	メトロニダゾール	限		
	アネレム静注用(50mg/瓶)	レミゾラム	—		
	アピドラ注(100単位/mL・10mL/瓶)	インスリングルリジン	—	劇	Hi
	アプリスボ筋注用	組換えERSウイルスワクチン	限	劇	
	アプレゾリン(20mg/管)注	ヒドアラジン	—		
	アミオダロン(150mg/3mL/管)注	塩酸アミオダロン	—	劇	Hi
	アミカシン(100mg/1mL/管)注	アミカシン硫酸塩	—		
	アミサリン(100mg/1mL/管)注	ブロカインアミド	—		Hi
	アミノレバニン(200mL/袋)注	肝不全用アミノ酸製剤注射液	—		
	アミバリン(200mL/袋)注		—		
	アムビゾールM(50mg/瓶)注	アムホテリシンB	—	毒	

備考	薬品名	成分名	限定	区分	ハイリスク薬
	アラセナA(300mg/瓶)注	ビ`タ`ラビン`	限		
【化療】	アラノジ`-(250mg/50mL/瓶)注	ネララビン`	限	劇	Hi
	アリナミンF注(100mg/20mL/管)	フルスルチアミン塩酸塩注射液	—		
	アリナミンVitB1(10mg/2mL/管)注	ブ`ロスルチアミン	限		
	アルカ`トロバ`ン注射液(10mg/20mL/管)	アルカ`トロバ`ン注射液(10mg/20mL/管)	限		
	アルギ`U(20g/200mL/袋)注	塩酸L-アルギ`ニン	限		
【検査用】	アルギ`ニン(30g/300mL/袋)注	アルギ`ニン	—		
【化療】	アルケラン(50mg/瓶)注	メルファラン	限	毒	Hi
	アルツデ`イスボ`関節注(25mg/2.5mL/筒)	精製ヒアルロン酸ナトリウムキット	—		
	アルテルナリア Algスクラッチ注	アレルゲ`ン	—		
【特生】	アルブ`ミン(献血)(25%・50mL/瓶)注	アルブ`ミン	—		
【特生】	アルブ`ミン(献血)(5%・100mL/瓶)注	アルブ`ミン	—		
【特生】	アルブ`ミン(献血)(5%・250mL/瓶)【肝移】注	アルブ`ミン	限		
【CD剤】	アルブ`ロスタジ`ルアルファデ`クス(20μg/瓶)注【後発・CD剤】	アルブ`ロスタジ`ルアルファデ`クス	—	劇	
【Lipo剤】	アルブ`ロスタジ`ル(10μg/2mL/管)注	アルブ`ロスタジ`ル	—	劇	
	アレルゲ`ンスクラッチエキス陽性対照液ヒスタミン二塩酸塩	アレルゲ`ンスクラッチエキス陽性対照液ヒスタミン	—		
	アレント`ロン酸点滴静注(900μg/100mL/袋)	アレント`ロン酸ナトリウム水和物	限		
	アロキシ(0.75mg/5mL/瓶)注	パ`ロ/セトロン塩酸塩	—	劇	
	アンチレクス(10mg/1mL/管)注	エド`ロニウム	—	劇	
	イーケブ`ラ(500mg/5mL/瓶)注	レベ`チラセタム	—		
	イオパ`ミド`-ル300注(100mL/瓶)	イオパ`ミド`-ル注射液	—		
	イオパ`ミド`-ル300注(20mL/瓶)	イオパ`ミド`-ル注射液	—		
	イオパ`ミド`-ル300注シリンジ` (100mL/筒)	イオパ`ミド`-ル注射液	—		
	イオパ`ミド`-ル370注(100mL/瓶)	イオパ`ミド`-ル注射液	—		
	イオパ`ミド`-ル370注(20mL/瓶)	イオパ`ミド`-ル注射液	—		
	イオパ`ミド`-ル370注シリンジ` (100mL/筒)	イオパ`ミド`-ル注射液	—		
	イオフェタミン(123I)注「第一」111		—		
	イオフェタミン(123I)注「第一」167		—		
	イオフェタミン(123I)注「第一」222		—		
	イオブ`ロミド` 300注シリンジ` (50mL/筒)「BYL」	イオブ`ロミド`	—		
	イオヘキソール300注(20mL/瓶)	イオヘキソール	—		
	イオヘキソール300注シリンジ` (100mL/筒)	イオヘキソール	—		
	イオヘキソール300注シリンジ` (150mL/筒)	イオヘキソールキット	—		
	イオヘキソール300注シリンジ` (50mL/筒)	イオヘキソールキット	—		
	イオメロン300注(100mL/瓶)	イオメブ`ロール注射液	—		
	イズ`カーゴ`点滴静注用(10mg/瓶)	パ`ビ`ナフスブ`アルファ (遺伝子組換え)	限	劇	
	イスコチン(100mg/2mL/管)注	イソニアジド`	限		
	イソビ`スト240注(10mL/瓶)	イソトロン注射液	—		

備考	薬品名	成分名	限定	区分	ハイリスク薬
	イピト300注(10mL/瓶)	イピトラン注射液	—		
【化療】	イタマイシン(5mg/瓶)注	イタリビシン	—	毒	Hi
	イデルビオン静注用(1000U/瓶)	アルブトレベノナコグアルファ	限		
	イデルビオン静注用(2000U/瓶)	アルブトレベノナコグアルファ	限		
	イデルビオン静注用(250U/瓶)	アルブトレベノナコグアルファ	限		
	イデルビオン静注用(500U/瓶)	アルブトレベノナコグアルファ	限		
	イヌリド(4g/40mL/瓶)点滴注(要希釈液)	イヌリン	—		
	イブグリース皮下注(250mg/2mL/キット)オートインジェクター	レブリスマブ(遺伝子組換え)	限	劇	
	イブグリース皮下注(250mg/2mL/筒)シリンジ	レブリスマブ(遺伝子組換え)	限	劇	
	イブリーフ(20mg/2mL/瓶)注	イブプロフェンL-リシン	—		
	イベニティ皮下注(105mg/1.17mL/筒)シリンジ	ロモソズマブ(遺伝子組換え)キット	限		
【化療】	イスマイト(1g/瓶)注	イスマファミド	—	劇	Hi
	仏ネース(35万単位/瓶)注	テロイクン(遺伝子組換え)	限	劇	Hi
	仏ノマックスγ(50万U/瓶)注	インターフェロンガンマ	限	劇	
	イモバックス® 財皮下注(0.5mL/筒)	ワクチン	—		
	イリス皮下注(150mg/1mL/瓶)	カキヌマブ	限	劇	
【化療】	イリノテカン(40mg/2mL)注	イリノテカン塩酸	—	劇	Hi
	イロケイト注(1000U/瓶)	エフラロクトコグ	限		
	イロケイト注(1500U/瓶)	エフラロクトコグアルファ	限		
	イロケイト注(2000U/瓶)	エフラロクトコグアルファ	限		
	イロケイト注(750U/瓶)	エフラロクトコグ	限		
	インジウムDTPA(111In)注37		—		
	インジゴカルミン(20mg/5mL/管)注	インジゴカルミン	—		
	インスリンアスパルトBS注(100単位/mL・10mL/瓶)NR	インスリンアスパルト	限	劇	Hi
	インスリンアスパルトBS注ノスター(300単位/3mL/キット)NR	インスリンアスパルト	—	劇	Hi
	インスリンリスプロBS注(100単位/mL・10mL/瓶)HU	インスリンリスプロ(遺伝子組換え)	限	劇	Hi
	インスリンリスプロBS注ノスター(300単位/3mL/キット)HU	インスリンリスプロ(遺伝子組換え)	限	劇	Hi
	インスリングルルギンBS注ミリオ(300U/3mL/キット)	インスリングルルギン	—	劇	Hi
	インドシン(1mg/瓶)注	インドメタシナトリウム	—	劇	
	インデラル(2mg/2mL/管)注	プロプラノロール	—	劇	
	イントラリオス(20%・50mL/袋)注	ダイズエ	—		
	イントラリオス【20%・100mL/袋】注	ダイズエ	—		
	インフリキシマブBS(100mg/瓶)注	インフリキシマブ	限	劇	Hi
	インフルエンザ「ヒケン」HA(1mL/瓶)	ワクチン	—	劇	
	インフルエンザ「フルビック」HAシリンジ(0.5mL/筒)注	インフルエンザ	—	劇	
	ヴァーン3G(500mL/袋)注		—		
	ヴァーンD(500mL/袋)注	サクサリナゲルエキ	—		
【特生】	ヴェノグロブリンH(献血)(「0.5g」/5mL/瓶)注	人免疫グロブリン	—		

備考	薬品名	成分名	限定	区分	ハイリスク薬
【特生】	ヴェノグロブリンH(献血)($<2.5\text{g}>/25\text{mL}/\text{瓶}$)注	人免疫グロブリン	—		
【特生】	ヴェノグロブリンH(献血)【10g/100mL/瓶】注	人免疫グロブリン	—		
	ウルトラテクネウ1.85		—		
	ウルトラテクネウ3.7		—		
	ウルトラテクネウ925		—		
	ウロナーゼ(6万U/瓶)注	ウロキナーゼ	—		
	ウロミテキサン(400mg/4mL/管)注	メスナ	—		
	エイムゲン(0.5mL/瓶)注	ワクチン	限	劇	
【化療】	エクザール(10mg/瓶)注	ビンブラスチン	—	劇	Hi
	エスポー・シリンジ(24000IU/0.5mL/筒)皮注	エポエチルアルファ	限		
	エタネルセプトBS皮下注ペン(50mg/1mL/キット)	エタネルセプト(遺伝子組換え)キット	—	劇	Hi
	エダマメ(ダイズ)Algsクラッチ注	アレルゲン	—		
	エダラボン(30mg/20mL/瓶)注	エダラボン	—		
	エトキシスクロール(1%・30mL/瓶)注	ポリドカノール	—	劇	
【化療】	エトボシド(100mg/5mL)注	エトボシド	—	劇	Hi
	エナルモンデポ(125mg/1mL/管)注	テストステロン	—		
	エナルモンデポ【250mg/1mL/管】注	エナント酸テストステロン	—		
	エヌジエンラ皮下注(24mg/1.2mL/筒)ペン	ソマトロロン(遺伝子組換え)キット	—		
	エヌジエンラ皮下注(60mg/1.2mL/筒)ペン	ソマトロロン(遺伝子組換え)キット	—		
	エパシエルト筋注セット(各150mg/1.5mL/瓶)	チキサギヒマフ/シルカヒマフ	限		
	エフェドリン(塩酸)(40mg/1mL/管)注	エフェドリン	—	劇	
	エポエチンアルファBS注(750IU/0.5mL/瓶)「JCR」	エポエチンカッパ	—	劇	
	エチール(10mg/1mL/管)注	エチレフリン塩酸塩	限	劇	
	エポプロステノール(0.5mg/瓶)「ヤセン」静注	エポプロステノールナトリウム静注用	限	劇	Hi
	エポプロステノール(1.5mg/瓶)「ヤセン」静注	エポプロステノールナトリウム静注用	限	劇	Hi
【化療】	エポルトラ(20mg/20mL/瓶)点滴注	クロファラビン	限	劇	Hi
	エラスポール(100mg/瓶)注	シベレスタットナトリウム	限		
	エラブレース(6mg/3mL/瓶)注	イデュルスルファゼ	—	劇	
【化療】	エルウィナーゼ注(10000単位)	エルウィニアル-アスパラキナー	限		Hi
	エルネオパNF1号(1000mL/キット)点滴注		—		
	エルネオパNF2号(1000mL/キット)点滴注		—		
	エンタビオ(300mg/瓶)注	ベドリスマフ	—	劇	
	エンタビオ皮下注ペン(108mg/0.68mL/キット)	ベドリスマフ(遺伝子組換え)キット(2)	限	劇	
【化療】	エンドキサン(500mg/瓶)注	シクロホスファミド	—	劇	Hi
	エンブレル皮下注(25mg/瓶)	エタネルセプト	限	劇	Hi
	エンブレル皮下注シリンジ(25mg/0.5mL/筒)	エタネルセプト	限	劇	Hi
	オーツカMV注		—		
【化療】	オキサリプラチン(100mg/20mL/瓶)注	オキサリプラチン	限	毒	Hi

備考	薬品名	成分名	限定	区分	ハイリスク薬
	オキファスト(10mg/1mL/管)注	オキシコドン	—	麻	Hi
	オクトロスキャン(111In)注静注用セット		—		
	オクトレオチド [®] (100μg/1mL/管)注	オクトレオチド [®]	—	劇	
	オクトレオチド [®] (50μg/1mL/管)注	オクトレオチド [®]	—	劇	
	オセネック皮下注(2mg/1.5mL/筒)	セマグレルチド [®] (遺伝子組換え)キット	限		Hi
	おたふくかぜ生ワクチン「第一三共」皮下		—	劇	
	オノアクト(50mg/瓶)注	ランゾール塩酸塩	—	劇	Hi
	オピソート(100mg/管)注	アセチルコリン	—	劇	
【化療】	オプジーボ [®] 点滴静注(100mg/10mL/瓶)	ニボルマブ [®] (遺伝子組換え)注射液	限	劇	Hi
【化療】	オプジーボ [®] 点滴静注 (20mg/2mL/瓶)	ニボルマブ [®] (遺伝子組換え)注射液	限	劇	Hi
	オプレイ320シリンジ (75mL/筒)	イオヘールソールキット	—		
	オプレイ320注(20mL/瓶)	イオヘールソールキット	—		
	オプレイ350注(100mL/瓶)	イオヘールソールキット	—		
	オプレイ350注(20mL/瓶)	イオヘールソールキット	—		
	オムニパーク300注シリンジ (100mL/筒)	イオヘキソールキット	—		
	オムニパーク300注シリンジ (150mL/筒)	イオヘキソールキット	—		
	オメプラゾール(20mg/瓶)注	オメプラゾール	—		
	オルダミン1g(10g/瓶)注	オレイン酸モノエタノールアミン	限	劇	
	オルビネオ静注用(1000単位/瓶)	エファネソクコグ [®] アルファ(遺伝子組換え)注	限		
	オルビネオ静注用(500単位/瓶)	エファネソクコグ [®] アルファ(遺伝子組換え)注	限		
	オルトレブ [®] (150mg/瓶)注	コリスチン	限	劇	
	オルブロキサ(1000単位/瓶)注	エフトレノコグ [®] アルファ	限		
	オルブロキサ静注用(3000単位/瓶)	エフトレノコグ [®] アルファ	限		
	オレンシア(250mg/瓶)注	アバタセプト	限	劇	
	オレンシア注(125mg/1mL/キット)オートインジェクター	アバタセプト	限	劇	Hi
	オレンシア皮下注シリンジ (125mg/1mL/筒)	アバタセプト	限		Hi
【化療】	オンキasp [®] 点滴静注(3750IU/瓶)	ベグアスバルガ [®] -セ [®]	限	劇	Hi
【化療】	オンコビン(1mg/瓶)注	ビンクリスチン	—	劇	Hi
	オンダネトロン(4mg/2mL/筒)注	オンダネトロン塩酸塩水和物キット	—	劇	
	オンボ [®] 点滴静注(300mg/15mL/瓶)	ミリクス [®] マブ [®]	限	劇	
	オンボ [®] 皮下注オートインジェクター(100mg/1mL/キット)	ミリクス [®] マブ [®] (遺伝子組換え)キット(2)	限	劇	
	オンボ [®] 皮下注シリンジ (100mg/1mL/筒)	ミリクス [®] マブ [®] (遺伝子組換え)キット(1)	限	劇	
	ガーダシル水性懸濁筋注(0.5mL/筒)	ワクチン	—	劇	
	カーデイオライト注射液 第一370		—		
	カーデイオライト注射液 第一740		—		
	カーデイオライト注射液第一600		—		
	カーボスター透析液L(A9L・B11.5L/組)		—		
	カスター(20mg/2mL/管)注	ファモチジン	限		

備考	薬品名	成分名	限定	区分	ハイリスク薬
	カトビースト静注60.47% (2mL/瓶・1.0mol/L)	カトブトロール	—		
	カトビースト静注シリンジ 60.47% (5mL/筒・1.0mol/L)	カトブトロールキット	—		
	カトビースト静注シリンジ 60.47% (7.5mL/筒・1.0mol/L)	カトブトロールキット	—		
	カハムグーラ花粉 Algスクラッチ注	アレルゲン	—		
	カニレスト皮下注(0.25mg/0.5mL/筒)シリンジ	カニレリクス酢酸塩キット	限	劇	
	カベキサートメシル酸塩(100mg/瓶)注	カベキサートメシル酸塩	—	劇	
	カベキサートメシル酸塩(500mg/瓶)注	カベキサートメシル酸塩	限	劇	
	カモグーラ花粉 Algスクラッチ注	アレルゲン	—		
	カモグーラ減感作注(1000倍)	アレルゲン	—		
	カモグーラ減感作注(1000万倍)	アレルゲン	—		
	カモグーラ減感作注(100万倍)	アレルゲン	—		
	カモグーラ減感作注(10万倍)	アレルゲン	—		
	カモグーラ減感作注(1億倍)	アレルゲン	—		
	カモグーラ減感作注(1万倍)	アレルゲン	—		
	カルチコール(425mg/5mL/管)注	カルシウム	—		
	カルデイオダイン注111		—		
	カルベニン(500mg/瓶)点滴注		限		
【化療】	カルボプラチン(150mg/15mL)注	カルボプラチン	—	毒	Hi
【化療】	カルボプラチン(50mg/5mL)注	カルボプラチン	—	毒	Hi
	カサイダス(50mg)点滴注	カサボファンギン	—	劇	
【特生】	カンマガード【非献血】(5g/96mL/瓶)注	人免疫グロブリン	限		
	カンレノ酸カリウム(100mg/瓶)注	カンレノサンカリウム	—	劇	
	キシロカイン E(ヒパシナ含有) (0.5%) (20mL/瓶)注	リドカインヒパシナ	—	劇	
	キシロカイン E(ヒパシナ含有) 【1%】 (20mL/瓶)注	リドカインヒパシナ	—	劇	
【静注用】	キシロカイン(2%・5mL/管)注	リドカイン	—	劇	Hi
	キシロカインカートリッジ(歯科用)(1.8mL/管)注	リドカインヒパシナ	—	劇	
	キトニシンチTc-99m注185		—		
	キトニシンキット		—		
	キヤハロン髄注(0.005%・0.05mg/mL) (1mL/管)	ハクロフェン	限	劇	
	キヤハロン髄注(0.05%・0.5mg/mL) (20mL/管)	ハクロフェン	限	劇	
	キヤハロン髄注(0.2%・2mg/mL) (5mL/管)	ハクロフェン	限	劇	
【特生】	キュービートル20%皮下注(2g/10mL/瓶)	pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下)	—		
【特生】	キュービートル20%皮下注 (4g/20mL/瓶)	pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下)	—		
【特生】	キュービートル20%皮下注(8g/40mL/瓶)	pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下)	—		
	キュービシン(350mg/瓶)注	ダブトマイシン	限		
【化療】	キサイト(200mg/10mL)注	シタラビン	—	劇	Hi
【化療】	キサイト(20mg/1mL)注	シタラビン	—	劇	Hi
【化療】	キサイト(60mg/3mL)注	シタラビン	—	劇	Hi

備考	薬品名	成分名	限定	区分	ハイリスク薬
【化療】	キオサイト N(1000mg/50mL)静/点滴/注	シタラビド	—	劇	Hi
【化療】	キオサイト N(400mg/20mL)注	シタラビド	—	劇	Hi
	クエン酸ガリウム(67Ga)注NMP37		—		
	クエン酸ガリウム(67Ga)注NMP74		—		
	クエン酸ガリウム-Ga67注射液37		—		
	クエン酸ガリウム-Ga67注射液74		—		
	クステイオール液(1L/瓶)	ブレッツシュナイダー	限		
	グラセトン(1mg/1mL/管)注	グラセトン塩酸塩	—	劇	
	グラセトン(3mg/3mL/管)注	グラセトン塩酸塩	—	劇	
	クラフォラン(1000mg/瓶)注 [同:セフォタックス]	セフォキシム	—		
	クラフォラン(500mg/瓶)注 [同:セフォタックス]	セフォキシム	—		
	クリアクター(40万IU/瓶)注	モンテプラーゼ	限		
	クリアボーンキット		—		
	クリアボーン注555		—		
	クリアボーン注740		—		
	クリスベータ皮下注(10mg/1mL/瓶)	ブロスマブ (遺伝子組換え)	限	劇	
	クリスベータ皮下注(20mg/1mL/瓶)	ブロスマブ	限	劇	
	クリスベータ皮下注(30mg/1mL/瓶)	ブロスマブ (遺伝子組換え)	限	劇	
	グリセリン・果糖配合点滴(200mL/袋)注	グリセリン・果糖	—		
	クリンダマイシン(300mg/2mL/管)注	クリンダマイシン	—		
	グルカゴンG/ボ (1mg/瓶)注	グルカゴン	—	劇	
	グルタルアルデヒド 液(0.6%・50mL/瓶)		—		
	クレキサン皮下注キット(2000IU/0.2mL/筒)	エノキサパリンナトリウムキット	—	劇	
	グロウジエト皮下注	ソマトロピン	—		
	グロウジエト皮下注(6mg/筒)	ソマトロピン	—		
【特生】	クロスエイトMC(献血)注(1000U/瓶)	乾燥濃縮人血液凝固第8因子	限		
【特生】	クロスエイトMC(献血)注(2000U/瓶)	乾燥濃縮人血液凝固第8因子	限		
【特生】	クロスエイトMC(献血)注(250U/瓶)	乾燥濃縮人血液凝固第8因子	限		
【特生】	クロスエイトMC(献血)注(500U/瓶)	乾燥濃縮人血液凝固第8因子	限		
【特生】	グロベニル 静注用(0.5g/瓶)	乾燥ポリエチレン glycol 処理人免疫グロ	—		
【特生】	グロベニル 静注用【5g/瓶】	乾燥ポリエチレン glycol 処理人免疫グロ	—		
【特生】	ケイセントラ(1000IU/瓶)注	プロトロンビン	限		
【特生】	ケイセントラ(500IU/瓶)注	プロトロンビン	限		
	ケイツーN(10mg/2mL/管)注	メテトレノ	—		
	ケタール(200mg/20mL/瓶)注	ケタミン塩酸塩	—	麻	Hi
	ケナコルト-A(40mg/1mL/瓶)注	トリアムシノロンアセトニド	—		
	ケナコルト-A注【50mg/5mL/瓶】	トリアムシノロンアセトニド	限		
	ケブザラ皮下注(200mg/キット)オートインジェクター	サリルマブ	限	劇	Hi

備考	薬品名	成分名	限定	区分	ハイリスク薬
	ゲンタマイシン(10mg/1mL/管)注	ゲンタマイシン	—	劇	
	ゲンタマイシン(40mg/1mL/管)注	ゲンタマイシン	—	劇	
	コアテック(5mg/5mL/管)注	オルブリン	限		
	コートロシン(0.25mg/瓶)注	テトラコサクト酢酸塩注射用	—		
	コートロシンZ(0.5mg/1mL/瓶)筋注	テトラコサクト酢酸塩注射液	—		
	コービック水性懸濁注シリンジ (0.5mL/筒)<5種混合>	沈降精製百日せき菌フェリア破傷風不活	—	劇	
【化療】	コスメゲン(0.5mg/瓶)注	アクチノマイシンD	—	劇	Hi
	コセテイクス皮下注(75mg/0.5mL/筒)	セキヌマブ(遺伝子組換え)キット	限	劇	
	コナールエフ皮下注ペン(150IU/筒)	ホリトロニンアルファ	—		
	コナトロン注用(5000U/瓶)<バイアル>	注射用ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン	—		
	コバールトリイ(1000U/瓶)注	オクトコグベータ	限		
	コバールトリイ(2000U/瓶)注	オクトコグベータ	限		
	コバールトリイ(250U/瓶)注	オクトコグベータ	限		
	コバールトリイ(500U/瓶)注	オクトコグベータ	限		
	コントミン(10mg/2mL/管)注	クロルプロマジン	—	劇	
【特生】	コンファクトF静注用(1000単位/瓶)	血液凝固第Ⅷ因子	限		
【特生】	コンファクトF静注用(250単位/瓶)	血液凝固第Ⅷ因子	限		
【特生】	コンファクトF静注用(500単位/瓶)	血液凝固第Ⅷ因子	限		
【化療】	サイメリン注(100mg/瓶)	ラムスチン注射用	限	劇	Hi
【化療】	サイメリン注(50mg/瓶)	ラムスチン注射用	限	劇	Hi
【免疫】	サイモグロブリン(25mg/瓶)注	抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グロブリン	限	劇	Hi
【化療】	サイモグロブリン(25mg/瓶)注	抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グロブリン	限		Hi
	ザバクサ配合点滴静注用(1500mg/瓶)	セフトラザン硫酸塩・タゾバクタムナトリウム	限		
	ゼビロン(500mg/瓶)注	デクストラゾキサソ	限	劇	
	ザビセフタ配合点滴静注用(2500mg/瓶)	アビクタム・セフトラザン	限		
	ザネロ点滴静注(300mg/2mL/瓶)	アニロルマブ(遺伝子組換え)	限	劇	Hi
	ザバパック血液ろ過用補充液-Bi(2020mL/袋)		—		
	ザムス点滴静注用(8mg/瓶)	トルバプタンリン酸エステルナトリウム注射用	限	劇	
	ザム点滴静注セット(36.3%50mL/管・希釈液付)注	トロメタモール注射液	限		
【免疫】	サンディミューン(250mg/5mL/管)注	シクロスポリン	—	劇	Hi
	サントスタチンLAR筋注(10mg/キット)	オクトレオチド	—	劇	
	サントスタチンLAR筋注(20mg/キット)	オクトレオチドサクサンエン	限	劇	
	サンリズム注(50mg/5mL/管)	塩酸ピルジカニド	限	劇	Hi
	ジアグノグリン注(25mg/瓶)	インドシアニングリン	限		
	シアノキット<5000mg/瓶セット>注	ヒドロキソコバラミン	—		
	シアノコバラミン(B12)(1000μg/1mL/管)注	シアノコバラミン	限		
	ジラスタ(3.6mg/筒)皮下注	ベグフィルグラスチム	限		
	ジェビックV・日本脳炎ワクチン(0.5mL/瓶)	ワクチン	限	劇	

備考	薬品名	成分名	限定	区分	ハイリスク薬
	ジエノロピノール-クイック(12mg/キット)注	ソマトロピン	—		
	ジエノロピノール-クイック(5.3mg/キット)注	ソマトロピン	—		
	シグニフォルLAR筋注(10mg/キット)	パシロキドパモ酸塩	限	劇	
	シグニフォルLAR筋注(20mg/キット)	パシロキドパモ酸塩	限	劇	
	シグニフォルLAR筋注(30mg/キット)	パシロキドパモ酸塩	限	劇	
	シグニフォルLAR筋注(40mg/キット)	パシロキドパモ酸塩	限	劇	
	シグニフォルLAR筋注(60mg/キット)	パシロキドパモ酸塩	限	劇	
【ジゴ】	ジゴシン(0.25mg/1mL/管)注	ジゴキシン	—	劇	Hi
	シザリン配合点滴静注液(2mL/管)	塩化マンガニ・硫酸亜鉛配合2mL注射	—		
【化療】	シスプラチン(10mg/20mL)注	シスプラチン	—	毒	Hi
【化療】	シスプラチン(50mg/100mL)注	シスプラチン	—	毒	Hi
	ジスロマック注(500mg/瓶)	アジスロマイシン	限		
【化療】	シタラビン(1000mg/50mL)注	シタラビン	—	劇	Hi
【化療】	シタラビン(400mg/20mL)注	シタラビン	—	劇	Hi
	シトフォール(375mg/5mL)点滴注		限		
	シナジス注液(50mg/0.5mL)	パリビスマブ	—		
	シナジス注液【100mg/1mL】	パリビスマブ	—		
【化療】	ジフォルタ注(20mg/1mL/瓶)	ブラトレキサート	限	劇	Hi
	ジフテリア破傷風(DT)混合トキソイド(0.1mL/瓶)注	ジフテリアハショウフウトキソイド	—		
	シプロフロキサシン(200mg/100mL)注	シプロフロキサシン	限		
	シベンノール(70mg/5mL/管)注	シベンゾリン	限	劇	Hi
	シムジア皮下注(200mg/1mL/キット)オートクリックス	セルトリスマブヘコル(遺伝子組換え)	限	劇	Hi
	シムジア皮下注シリンジ(200mg/1mL/筒)	セルトリスマブヘコル	限	劇	Hi
【免疫】	シムレク(10mg/瓶)注	パシキシマブ	—	劇	Hi
【免疫】	シムレク(20mg/瓶)注	パシキシマブ	限	劇	Hi
	ジヤグイモAlgスクラッチ注	アレルゲン	—		
	シカド9水性懸濁筋注シリンジ(0.5mL/筒)	組換え沈降9価ヒトパピローマウイルス様粒	—	劇	
	シグリックス筋注用	乾燥組換えI帯状疱疹ワクチン(チャイニーズハ	限	劇	
	シビット(50mg/瓶)注	ニフェカラン	—	劇	
	シボニー(50mg/0.5mL/筒)皮下注	ゴリムマブ	限	劇	Hi
	スカマデクス静注液(200mg/2mL/筒)シリンジ	スカマデクスナトリウム	—		
【筋弛緩】	スキサメニウム注(40mg/2mL/管)	スキサメニウム塩化物注	限	毒	Hi
	スキャンドネストカートリッジ 歯科用(3%1.8mL/管)	メピバカイン	—		
	スクリージ点滴静注(600mg/10mL/瓶)	リサンキズマブ	限	劇	
	スクリージ皮下注(180mg/1.2mL/キット)オートドーズー	リサンキズマブ	限	劇	
	スクリージ皮下注(360mg/2.4mL/キット)オートドーズー	リサンキズマブ	限	劇	
	スキ花粉 Algスクラッチ注	アレルゲン	—		
	スズコロイド Tc-99m注調整用キット		—		

備考	薬品名	成分名	限定	区分	ハイリスク薬
	ステラ-ラ(130mg/26mL/瓶)注	ウステキヌマブ*	—	劇	Hi
	ステラ-ラ皮下注シリンジ (45mg/0.5mL)	ウステキヌマブ* (遺伝子組換え) キット	—	劇	Hi
	ステルイズ 水性懸濁筋注シリンジ (240万単位/4mL/筒)	ヘンジ* ルペ ニシリンヘ* ンザ* チン水和物キット	—		
	ステルイズ 水性懸濁筋注シリンジ (60万単位/1mL/筒)	ヘンジ* ルペ ニシリンヘ* ンザ* チン水和物キット	—		
	ストレブ トマイシン硫酸塩(1000mg/瓶)注	ストレブ トマイシン	限		
	ストレンジ ック(12mg/0.3mL/瓶)注	ホスファターゼ*	限		
	ストレンジ ック(18mg/0.45mL/瓶)注	アスターゼ*	限	劇	
	ストレンジ ック(28mg/0.7mL/瓶)注	アスターゼ* アルファ (遺伝子組換え)	限	劇	
	ストレンジ ック(40mg/1mL/瓶)注	アスターゼ* アルファ (遺伝子組換え)	限	劇	
	ストレンジ ック(80mg/0.8mL/瓶)注	アスターゼ* アルファ (遺伝子組換え)	限	劇	
【免疫】	スパ ニジ* ン(100mg/瓶)注	塩酸グ* スペ リムス	限	劇	Hi
	スピ ンラザ* 髄注(12mg/5mL/瓶)	ヌシネルセンナトリウム	限		
	ズ* ファジ* ラン(5mg/1mL/管)注	イクスプ* リン	—	劇	
	スミフェロンDS(300万U/筒)注	インターフェロンアルファ	限	劇	
	スルハ* シリン(1500mg/瓶)注	スルハ* クタムアンピ* シリン	—		
	スルハ* シリン(750mg/瓶)注	スルハ* クタムアンピ* シリン	—		
	スロンノンHI (10mg/2mL/管)注	アルガ トロバ* ン	限		
	セトロタイド* (0.25mg/瓶)注	セトロレリクス	—	劇	
	セ* ビ* ユ* ャ* イ(500mg/8mL/瓶)点滴注	ソトロビ* マブ* (遺伝子組換え)	限		
	セファゾ* リンNa(1000mg/瓶)注	セファゾ* リン	—		
	セファゾ* リンNa点滴用パ* ッグ* (1000mg/100mL/袋)	セファゾ* リンナトリウムキット	—		
【特生】	セプ* -ロチン静注用(1000単位/瓶)	乾燥濃縮人プ* ロテインC	限		
	セフェピ* ム(1000mg/瓶)注	セフェピ* ム	—		
	セフェピ* ム塩酸塩静注用(500mg/瓶)	セフェピ* ム塩酸塩水和物注射用「サント*」	—		
	セフォチアム(1000mg/瓶)注	セフォチアム	—		
	セフトジ* ジ* ム(1000mg/瓶)注	セフトジ* ジ* ム	—		
	セフトジ* ジ* ム(500mg/瓶)注	セフトジ* ジ* ム	—		
	セフトリアキソンナトリウム(500mg/瓶)注	セフトリアキソンナトリウム	—		
	セフメタゾ* ール(1000mg/瓶)注	セフメタゾ* ールナトリウム	—		
	セルシオ液(1L/袋)		限		
	セレザ* イム(400U/瓶)注	イミグ* ルセラ-ゼ*	限	劇	
	セレネ-ス(5mg/1mL/管)注	ハロペ* リド* ール	—	劇	
	セレブ* ロテックキット		—		
	ソグ* ル-ヤ皮下注(10mg/1.5mL/筒)	ソマブ* シタン(遺伝子組換え)キット	—		
	ソグ* ル-ヤ皮下注(5mg/1.5mL/筒)	ソマブ* シタン(遺伝子組換え)キット	—		
	ソセコ* ン(15mg/1mL/管)注	ペ* ンタゾ* シン	—	・向二	
	ソマゾ* ン(10mg/瓶)注	メカセルミン	限	劇	
	ソマチュリン(120mg/筒)皮下注	ランレオチド* 酢酸塩	限	劇	

備考	薬品名	成分名	限定	区分	ハイリスク薬
	ソマトロピンBSシュアパル(5mg/筒)注	ソマトロピン(遺伝子組換え)	—		
	ソマトロピンBSシュアパル【10mg/筒】注	ソマトロピン(遺伝子組換え)	—		
	ソリケ配合注ロスター(300dose/3mL/キット)	インスリングルリクソ/リキシナット	限	劇	Hi
	ソリタックスH輸液(500mL/袋)注		—		
	ソリス(300mg/30mL/瓶)点滴注	エクリス マフ	限	劇	
	ソル・コーテフ注射用(100mg/瓶)	ヒド ロコルチゾ ソコハク酸エステルナトリウム	限		
	ソル・コーテフ注射用(250mg/瓶)	ヒド ロコルチゾ ソコハク酸エステルナトリウム注射用	限		
	ソルアセトF(500mL/袋)注	サクサンリゲ ルエキ	—		
	ゾ ルゲ ンスマ点滴静注	オナセム/ゲ ン アベ パ ルホ ベ ク	限		
	ゾルダ クトン注(100mg/管)	カンレ/サンカリウム	—	劇	
	ゾレム 【1】 輸液 (500mL/袋)注	開始液	—		
	ゾレム 【1】 輸液 ★<200mL/袋>注	開始液	—		
	ゾレム 【2】 輸液 (500mL/袋)注	脱水補給液	—		
	ゾレム 【3A G】 輸液 (500mL/袋)注	維持液	—		
	ゾレム 【3A】 輸液 (500mL/袋)注	維持液	—		
	ゾレム 【3A】 輸液 ★<200mL/袋>注	維持液	—		
	ゾルトファイ配合注フレクスタッチ(300dose/3mL/キット)	インスリンテ グルゲ ク/リラグ ルチド	限	劇	Hi
	ゾルメド ロール(125mg/瓶)注	メチルプ レト ニゾ ロンコハクサンナトリウム	—		
	ゾルメド ロール(500mg/瓶)注	メチルプ レト ニゾ ロンコハクサンエステル	—		
	ゾラクト注 TP-C05NR(500mL/袋)	乳酸リンゲ ル液	限		
	ゾレア皮下注(150mg/1mL/キット)ペン	オマリス マフ	限	劇	
	ゾレア皮下注(300mg/2mL/キット)ペン	オマリス マフ (遺伝子組換えI)キット(2)	限	劇	
	ゾレア皮下注(75mg/0.5mL/キット)ペン	オマリス マフ (遺伝子組換えI)キット(2)	限	劇	
	ゾレア皮下注シリンジ (150mg/1mL/筒)	オマリス マフ	限	劇	
	ゾレト ロン酸(4mg/5mL/瓶)注	ゾレト ロン酸	限	劇	
	ダ イモックス(500mg/瓶)注	アセタゾ ラミト ナトリウム	—		
	ダイガ シル(50mg)点滴注	チゲ サイクリン	限		
【化療】	ダウマイシン(20mg/瓶)注	ダウルビ シン	—	劇	Hi
【化療】	ダカルバ ジ ン(100mg/瓶)注	ダカルバ ジ ン	限	劇	Hi
【化療】	タキソール(100mg/16.7mL/瓶)注<6mg/mL>	パ クリタキセル	限	毒	Hi
【化療】	タキソール(30mg/5mL/瓶)注	パ クリタキセル	限	毒	Hi
	タクザ イロ皮下注シリンジ (300mg/2mL/筒)	ラナデルマフ (遺伝子組換えI)キット	限		
	タコ Algスクラッチ注	アレルゲ ン	—		
	タゾ ビ ベ (2250mg/瓶)配合静注用「ニプロ」	タゾ バ クタムナトリウム・ビ ベ ラシリンナトリウム	—		
	タゾ ビ ベ (4500mg/瓶)配合静注用「ニプロ」	タゾ バ クタムナトリウム・ビ ベ ラシリンナトリウム	—		
	ダットスキャン(167MBq/2.25mL/筒)注		—		
	ダニ(D.F.) Algスクラッチ注	アレルゲ ン	—		
【化療】	ダラザ レックス点滴静注(100mg/5mL/瓶)	ダ ラツマフ (遺伝子組換えI)注射液	限	劇	Hi

備考	薬品名	成分名	限定	区分	ハイリスク薬
【化療】	ダ`ラザ`レックス点滴静注(400mg/20mL/瓶)	ダ`ラツマフ` (遺伝子組換えI)注射液	限	劇	Hi
	ダ`ルテハ`リンNa (5000単位/5mL) 静注	ダ`ルテハ`リンナトリウム	限		
	ダ`ルベ`ホ`エチンアルファ(120 μ g/0.5mL/筒)注	ダ`ルベ`ホ`エチンアルファ	—	劇	
	ダ`ルベ`ホ`エチンアルファ(15 μ g/0.5mL/筒)注	ダ`ルベ`ホ`エチンアルファ	—	劇	
	ダ`ルベ`ホ`エチンアルファ(30 μ g/0.5mL/筒)注	ダ`ルベ`ホ`エチンアルファ	—	劇	
	ダ`ルベ`ホ`エチンアルファ(60 μ g/0.5mL/筒)注	ダ`ルベ`ホ`エチンアルファ	—	劇	
【筋弛緩】	ダ`ントリウム(20mg/瓶)注	ダ`ントロレンナトリウム	—		
	タンボ`コル(50mg/5mL/管)注	フレカイニド`酢酸塩	限	劇	Hi
	チエム点滴静注用(500mg/瓶)	イミペ`ネム水和物・シラスチンナトリウム注射用	限		
	チモシー花粉 Algスクラッチ注	アレルゲ`ン	—		
	チョコラA(5万U/1mL/管)注	ハ`ルミチン酸レチノール	—		
	チラーヂ`ンS静注液(200 μ g/1mL/管)	レボ`チロキシナトリウム水和物注射液	限	劇	
	テイコブ`ラニン(200mg/瓶)注	テイコブ`ラニン	限	劇	
	デ`キート注射液(1.65mg/0.5mL/管)	デ`キサメタゾ`ンリン酸エステルナトリウム注射液	—		
	デ`キストランL(低分子)(500mL/瓶)注	ニューサンリンゲ`ル	限		
	テクネDMSAキット		—		
	テクネDTPAキット		—		
	テクネMAAキット		—		
	テクネMAG3キット		—		
	テクネMAG3注射液200		—		
	テクネMDP注(370MBq)		—		
	テクネMDP注(555MBq)		—		
	テクネMDP注(740MBq)		—		
	テクネシンチ注-10M370		—		
	テクネシンチ注-20M740		—		
	テクネゾ`ール740		—		
	テクネビ`ロリン酸キット		—		
	テクネフチン酸キット		—		
	デ`スフェール(500mg/瓶)注	デ`フェロキサミン	—	劇	
	デ`スモブ`レシン(4 μ g/1mL/管)静注	酢酸デ`スモブ`レシン	限	劇	
【特生】	テタノブ`リンH【非献血】(250U/3.4mL/瓶)注	ゲ`ロブ`リン	—		
	デ`トキソール(2g/20mL/瓶)注	チオリユサンナトリウム	—		
	デ`ノシン(500mg/瓶)注	ガンシクロピ`ル	—	毒	
	デ`ヒド`ロコール酸(10%・1000mg/10mL/管)注	デ`ヒド`ロコールサン	—		
	デ`ファイテリオ静注(200mg/2.5mL/瓶)	デ`フィブ`ロチド`ナトリウム	限		
【化療】	テモダ`ール(100mg/瓶)注	テモゾ`ロミド`	限	毒	Hi
	デ`ュビ`ケント皮下注シリンジ` (200mg/1.14mL/筒)	デ`ュビ`ルマフ`	—	劇	
	デ`ュビ`ケント皮下注シリンジ` (300mg/2mL/筒)	デ`ュビ`ルマフ`	限	劇	

備考	薬品名	成分名	限定	区分	ハイリスク薬
	デュピクセント皮下注 ^ペ ン(300mg/2mL/キット)	デュピクセント ^ム	—	劇	
	テリパチド酢酸塩(100U/瓶)注	酢酸テリパチド ^ム 注射用	限		
【化療】	トキソリビン塩酸塩(10mg/5mL)注	トキソリビン塩酸塩	—	劇	Hi
【DOA】	トパミン(100mg/5mL/管)注	トパミン塩酸塩「VTRS」	—	劇	Hi
【DOB】	トプタミン(100mg/5mL/管)注	トプタミン塩酸塩	—	劇	Hi
	トプラシン(90mg/1.5mL/管)注	トプラマイシン	限	劇	
	トプラシン注(10mg/1mL/管)	トプラマイシン	限	劇	
	トプラム(400mg/20mL/瓶)注	トプラム	限	劇	
	トマト Algスクラッチ注	アレルゲン	—		
	トラネキサム酸注(1g/10mL/管)	トラネキサム酸注射液	—		
	トラマル(100mg/2mL/管)注	トラマトール塩酸塩	—	劇	
	トランサミン(250mg/5mL/管)注	トラネキサムサン	—		
【化療】	トリセノックス(12mg/6mL/瓶)点滴静注	三酸化二ヒ素注射液	限	毒	Hi
	トリパソール ^ル -溶液1%(1mL/管)		限		
	トリビック(DPT)ワクチン(0.5mL/瓶)皮下注	百日せきジフテリア破傷風	—	劇	
	トレシーバ ^フ フレックスタッチ(300U/3mL/キット)注	インスリンデグludeク	限	劇	Hi
	トレブ ^ロ スト(100mg/20mL/瓶)注	トレブ ^ロ スチニル	限	劇	Hi
	トレブ ^ロ スト(200mg/20mL/瓶)注	トレブ ^ロ スチニル	限	劇	Hi
	トレブ ^ロ スト(20mg/20mL/瓶)注	トレブ ^ロ スチニル	限	劇	Hi
	トレブ ^ロ スト(50mg/20mL/瓶)注	トレブ ^ロ スチニル	限	劇	Hi
	ガ ^ラ ザ ^イ ム(5mg/5mL)点滴注	ガ ^ラ ルスルファ ^ゼ	限		
	ナファモスタットメシル酸塩(100mg/瓶)注	ナファモスタットメシル酸塩「AY」	—	劇	Hi
	ナファモスタットメシル酸塩注(50mg/瓶)	ナファモスタットメシル酸塩注射用	—	劇	Hi
	ナロキソン塩酸塩(0.2mg/1mL/管)注	ナロキソン塩酸塩	—	劇	
	ニカルジピン ^ン (10mg/10mL管)注	ニカルジピン ^ン 塩酸塩	—	劇	
	ニコペリック(1.5L・4袋/箱)	腹膜透析液(8-1)	—		
	ニト ^ロ ロ ^ド (30mg/10mL/管)注	ニト ^ロ ロ ^ド リット ^ナ トリウム	—	毒	
【化療】	ニト ^ロ ラン(25mg/瓶)注	ニムスチン塩酸	—	劇	Hi
	ニト ^ロ グ ^リ セリン(25mg/50mL/袋)注	ニト ^ロ グ ^リ セリン	—	劇	
	ニト ^ロ グ ^リ セリン(5mg/10mL/管)静注	ニト ^ロ グ ^リ セリン	—	劇	
	ニューモバ ^ッ ックスNP(0.5mL/筒)	ハイエンキウキンワクチン	—	劇	
	ニューロライト第一		—		
	ニューロライト注射液第一400		—		
	ニューロライト注射液第一600		—		
	ニンジ ^ン Algスクラッチ注	アレルゲン	—		
	ヌーイック静注用(1000単位/瓶)	シモクトコグ ^{アル} ファ(遺伝子組換え)注射	限		
	ヌーイック静注用(2000単位/瓶)	シモクトコグ ^{アル} ファ(遺伝子組換え)注射	限		
	ヌーイック静注用(250単位/瓶)	シモクトコグ ^{アル} ファ(遺伝子組換えI)注射	限		

備考	薬品名	成分名	限定	区分	ハイリスク薬
	ヌーイック静注用(500単位/瓶)	シモクトコグ アルファ(遺伝子組換え)注射	限		
	ヌーカア皮下注(100mg/1mL/筒)	メド リス マブ (遺伝子組換え)キット	限	劇	
	ネオアミュー(200mL/袋)注		—		
	ネオシジ ニコー7(1mg/1mL/管)注	フェニレフリン	—	劇	
	ネクスビ アサ イム点滴静注用(100mg/瓶)	アパ ルグ ルコシダ ーゼ アルファ(遺伝子組換え)	限	劇	
【特生】	ノイアト(献血)(500U/瓶)注	アンチロンビ ンIII	—		
	ノイマト ン(3.6単位/3mL/管)注	ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出	限		
	ノベ ルバ ール(250mg/瓶)注	フェバ ルビ タール	—	・向三	Hi
	ノモサング (250mg/10mL/管)注	ヘミン	限	劇	
	ノクサフィル(300mg/16.7mL/瓶)点滴注	ボ サコゾ ール	限	劇	
【特生】	ノバ クトM(1000U/瓶)静注用	乾燥濃縮人血液凝固第9因子	限		
【特生】	ノバ クトM(2000U)静注	乾燥濃縮人血液凝固第 9 因子	限		
【化療】	ノバ ントロン(10mg/5mL)注	ミトキサントロン	—	毒	Hi
	ノボ エイト(1500単位/瓶)注	ツロクトコグ アルファ(遺伝子組換え)注射	限		
	ノボ エイト(500単位/瓶)注	ツロクトコグ アルファ	限		
	ノボ セブ ンHIシリンジ (1mg/瓶)注	エブ タコグ アルファ	限		
	ノボ セブ ンHIシリンジ (2mg/瓶)注	エブ タコグ アルファ	限		
	ノボ ラビ ット 注(100単位/mL・10mL/瓶)	インスリン アスパ ルト	限	劇	Hi
	ノボ ラビ ット 注ベ ンソフィル(300U/3mL/筒)	インスリン アスパ ルト(遺伝子組換え)注射	—		Hi
	ノルアド リナリン(1mg/1mL/管)注	ノルエピ ネフリン	—	劇	Hi
	ノルデ イトロピ ンフレックスブ ロ(10mg/筒)注	ソマトロピ ン(遺伝子組換え)	—		
	ノルデ イトロピ ンフレックスブ ロ(5mg/筒)注	ソマトロピ ン(遺伝子組換え)	—		
	ノンスロン(献血)注(1500U/瓶)	アンチロンビ ンIII	限		
	パ ーヒューザ ミン注111		—		
	パ ーヒューザ ミン注148		—		
【化療】	ハイカムチン(1.1mg/瓶)注	塩酸/ギ テカン	限	劇	Hi
	ハイカリック3号注(700mL/袋)		限		
【特生】	パ ーイロット配合注	乾燥濃縮人血液凝固第10因子加活	限		
【特生】	ハイゼ ントラ 【非献血】 (20%・1g/5mL/瓶)注	ゲ ロブ リン	限		
【特生】	ハイゼ ントラ 【非献血】 (20%・2g/10mL/瓶)注	ゲ ロブ リン	限		
【特生】	ハイゼ ントラ 【非献血】 (20%・4g/20mL/瓶)注	ゲ ロブ リン	限		
	ハイド ロコートン(100mg/2mL/瓶)注	ヒド ロコルチゾ ンナトリウム	—		
	パ クトラミン(トリメプ リムとして80mg/5mL/管)注	トリメプ リム・スルファメトキサゾ ール製剤	限		
	パ クニバ ンス水性懸濁注シリンジ (0.5mL/筒)	沈降15価肺炎球菌結合型ワクチン(無	限	劇	
	パ パ ベ リン塩酸塩(40mg/1mL/管)注	塩酸パ パ ベ リン	—		
【特生】	ハブ トグ ロピ ン(献血)(2000U/100mL/瓶)注	ヒトハブ トグ ロピ ン	—		
	パ ミド ン酸二Na(15mg/瓶)「サリ」注	パ ミド ン酸二Na	—	劇	Hi
	パ ム(500mg/20mL/管)注	プ ラリト キシム	—		

備考	薬品名	成分名	限定	区分	ハイリスク薬
【化療】	ハラヴェン(1mg/2mL/瓶)注	エリブリンリン酸塩	限	毒	Hi
	ハル(100mg/1mL/管)筋注	ジメチルフェニール	—		
	パソマイシン(塩酸)(500mg/瓶)注	エンサンパソマイシン注射用	限		Hi
	パントール(100mg/1mL/管)注	パントール	—		
	ハンプ(1000μg/瓶)注	カルベリフト(遺伝子組換え)	—	劇	
	ビートン1号(1000mL/キット)注		—		
	ビートン2号(1100mL/キット)注		—		
	ビートン3号(1200mL/キット)注		—		
	ビートン輸液(500mL/袋)		—		
	ビームン【0.5mL/瓶】注	ワクチン	—	劇	
【化療】	ビートン(35μg/瓶)注	ブリンタマブ	限	劇	Hi
	ビートン(1mg/2mL/管)注	ビートン	—		
	ビートン(500mL/袋)注	重炭酸リンゲル液	—		
	ビートン(1000mg/瓶)注	アンピシリンナトリウム	—		
	ビートン(250mg/瓶)注	アンピシリンナトリウム	—		
	ビートン(500mg/瓶)注	アンピシリンナトリウム	—		
	ビートン(1KE/瓶)注	ヨウレンキンチュウシツブツ	—	劇	
	ビートン配合静注(20mL/管)	グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤注射	—		
	ビートン VitB2【20mg/2mL/管】注	リボフラビンリン酸エステルナトリウム	—		
【化療】	ビートン(100mg/瓶)注	アザチジン	限	劇	Hi
	ビートン(1瓶)注	ビートンB1・B6・B12	—		
	ビートン(100μg/瓶)注	コルチレリン「ニプロ」	—		
	ビートン(30mg/1mL/管)注	リン酸ビートン	—		
	ビートン(20U/1mL/管)注	パソレシン	—		
【化療】	ビートン(10mg/瓶)注	ビートン	—	劇	Hi
【化療】	ビートン(20mg/瓶)注	ビートン	—	劇	Hi
	ビートンNa(1000mg/瓶)注	ビートンナトリウム	—		
	ビートン注(5mg/5mL/瓶)	エロスルファートアルファ	限	劇	
	ビートン(100mg/10mL/瓶)点滴静注	ラコサミド	限	劇	
	ヒメガマ花粉 A Igスクラッチ注	アレグン	—		
	ヒューマリンR注(100単位/mL・10mL/瓶)	インスリンヒト	—	劇	Hi
	ヒューマリンR注ミリオペン(300U/3mL/キット)皮注	インスリンヒト(遺伝子組換え)キット	限	劇	Hi
	ヒューマログ(パイル)注(100単位/mL・10mL/瓶)	インスリンリスプロ	限	劇	Hi
	ヒューマログ注カート(300U/筒)	インスリンリスプロ	—	劇	Hi
	ヒューマログ注ミリオペン【HD】(300U/3mL/キット)	インスリンリスプロ	限	劇	Hi
	ヒューマログ皮下注シリンジ(20mg/【0.2mL】/筒)	アダリマブ	限	劇	Hi
	ヒューマログ皮下注ペン(40mg/0.4mL/キット)	アダリマブ	—	劇	Hi
	ヒューマログ皮下注ペン(80mg/0.8mL/キット)	アダリマブ(遺伝子組換え)	限	劇	Hi

備考	薬品名	成分名	限定	区分	ハイリスク薬
	ヒュンターゼ [®] 脳室内注射液(15mg/1mL/瓶)	インテュルスルファゼ [®] ベータ	限	劇	
【特生】	ヒ [®] リウ [®] イジ [®] ェン10%静注(10g/100mL/瓶)	pH4処理酸性人免疫グロブリン注射液	—		
【特生】	ヒ [®] リウ [®] イジ [®] ェン10%静注(2.5g/25mL/瓶)	pH4処理酸性人免疫グロブリン注射液	—		
【特生】	ヒ [®] リウ [®] イジ [®] ェン10%静注(5g/50mL/瓶)	pH4処理酸性人免疫グロブリン注射液	—		
	ヒリスコピ [®] ン50(100mL/瓶)注	イトロクス酸メグルミン注射液	—		
	ヒルトコン(0.5mg/1mL/管)注	ブ [®] ロチレリン	—		
【特生】	ファイバ [®] 【非献血】 注(1000U/瓶)	乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性	限		
	ファブ [®] ラザ [®] イム(35mg/瓶)注	アガ [®] ルンダ [®] ーゼ [®] ベータ(遺伝子)	限	劇	
	ファブ [®] ラザ [®] イム(5mg/瓶)注	アガ [®] ルンダ [®] ーゼ [®] ベータ(遺伝子)	限	劇	
	ファモチジ [®] ン(20mg/20mL/管)注	ファモチジ [®] ン	—		
	フィアスプ [®] 注(100単位/mL・10mL/瓶)	インスリン アスパルト	限	劇	Hi
	フィアスプ [®] 注フレックスタッチ(300U/3mL/キット)	インスリン アスパルト	—	劇	Hi
	フィアスプ [®] 注ペンフィル(300U/3mL/筒)	インスリン アスパルト	限	劇	Hi
	フィコンパ [®] 点滴静注用(2mg/瓶)	ペ [®] ランパ [®] ネル	—		
	フィジ [®] オ140輸液(500mL/袋)	フィジ [®] オ140輸液(500mL/袋)	—		
	フィニバ [®] ックス(250mg/瓶)注	ド [®] リハ [®] ネム水和物	限		
	ブ [®] イフェント [®] (200mg/瓶)注	ボ [®] リコゾ [®] ール	—	劇	
【特生】	フィブ [®] リノゲ [®] ンHT(1g/瓶)注	フィブ [®] リノゲ [®] ン	—		
【特生】	フィブ [®] ロ [®] ミンP 【非献】 (1瓶・溶解液4mL付)注	血液凝固第13因子	限		
	フィラジ [®] ル皮下注シリンジ [®] (30mg/3mL/筒)	イカチバ [®] ント	限		
	フィルグ [®] ラスチムBS(150 μ g/0.6mL/筒)注	フィルグ [®] ラスチム後続1	—		
	フィルグ [®] ラスチムBS(300 μ g/0.7mL/筒)注	フィルグ [®] ラスチム	—		
	フィルグ [®] ラスチムBS(75 μ g/0.3mL/筒)注	フィルグ [®] ラスチム後続1	—		
	ブ [®] ールシンチ注740		—		
	フェインジ [®] ェクト静注(500mg/10mL/瓶)	カルバ [®] キシマルトース第二鉄	—		
	フェジ [®] ン(40mg/2mL/管)注	含糖酸化鉄	—		
	フェトロージ [®] ャ点滴静注用(1000mg/瓶)	セフィテ [®] ロコルトシル酸塩硫酸塩水和物注	限		
	フェノール注射液5%(10mL/瓶)	フェノール	限	劇	
【後発】	フェンタニル(0.1mg/2mL/管)注	フェンタニルクエンサンエン	—	麻	Hi
	フォルテオ(600 μ g/キット)注	テリバ [®] ラチト [®]	限		
	ブ [®] スコパ [®] ン(20mg/1mL/管)注	スコボ [®] ラミン	—	劇	
【化療】	ブ [®] スルフェクス(60mg/10mL/瓶)注	ブ [®] スルファン	限	劇	Hi
	ブ [®] タサ花粉 Algスクラッチ注	アレルゲ [®] ン	—		
	ブ [®] タサ減感作注(1000倍)	アレルゲ [®] ン	—		
	ブ [®] タサ減感作注(1000万倍)	アレルゲ [®] ン	—		
	ブ [®] タサ減感作注(100万倍)	アレルゲ [®] ン	—		
	ブ [®] タサ減感作注(10万倍)	アレルゲ [®] ン	—		
	ブ [®] タサ減感作注(1億倍)	アレルゲ [®] ン	—		

備考	薬品名	成分名	限定	区分	ハイリスク薬
	ブタザン減感作注(1万倍)	アレルゲン	—		
	ブドウ糖注【10%】(20mL/管)	ブドウ糖	—		
	ブドウ糖注【10%】(500mL/瓶)	ブドウ糖	—		
	ブドウ糖注【20%】(20mL/管)	ブドウ糖	—		
	ブドウ糖注【5%】(★200mL/袋)	ブドウ糖	—		
	ブドウ糖注【5%】(100mL/瓶)	ブドウ糖	—		
【レジメン】	ブドウ糖注【5%】(100mL/瓶)	ブドウ糖	—		
【レジメン】	ブドウ糖注【5%】(200mL/袋)	ブドウ糖	—		
	ブドウ糖注【5%】(20mL/管)	ブドウ糖	—		
【レジメン】	ブドウ糖注【5%】(20mL/管)	ブドウ糖	—		
	ブドウ糖注【5%】(500mL/瓶)	ブドウ糖	—		
【レジメン】	ブドウ糖注【5%】(500mL/瓶)	ブドウ糖	—		
	ブドウ糖注【5%】<50mL/瓶>	ブドウ糖	—		
【レジメン】	ブドウ糖注【5%】<50mL/瓶>	ブドウ糖	—		
	ブドウ糖注【50%】(200mL/袋)	ブドウ糖	—		
	ブドウ糖注【50%】(20mL/管)	ブドウ糖	—		
	ブトラリア皮下注シリンジ(60mg/1mL/筒)	デノスマブ	限	劇	
	フルオレサイト(500mg/5mL/管)注	フルオレセイン	—		
【化療】	フルオロウラシル(1000mg/20mL/瓶)注	フルオロウラシル	限	劇	Hi
	フルカリック2号(1003mL)注		限		
	フルコナゾール(100mg/50mL)静注液	フルコナゾール	—		
	フルコナゾール(50mg/50mL)注	フルコナゾール	—		
【化療】	フルダラ(50mg/瓶)注	リン酸フルダラビン	限	劇	Hi
	フルマゼニル静注(0.5mg/5mL/筒)シリンジ	フルマゼニルキット	—	劇	
	ブリアミンP(200mL/袋)注		—		
【化療】	ブレイオ(5mg/瓶)注	ブレイオマイシン	限	劇	Hi
	ブレイテックス(200μg/2mL/瓶)注	エンサンデックスメトミジン注射液	—	劇	
	ブレイドン(水溶性)(10mg/管)注	ブレイドンナトリウム	—		
	ブレイドン(水溶性)(20mg/管)注	ブレイドンコハク酸エステルナトリウム	—		
	ブレバミス(240mg/12mL/瓶)注	レテルモビル	限	劇	
	ブレバナー20水性懸濁注(0.5mL/筒)	沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(無	—	劇	
	ブレイクシン・デポ-筋注(10mg/1mL/管)	エストラジール吉草酸エステル注射液	—		
【免疫】	ブレイクシン(2mg/0.4mL/管)注	タクロリムス	—	劇	Hi
	ブレイクシン・デポ-(125mg/1mL/管)注	ヒドロキシプロゲステロン	—		
	ブレイクシン(100mg/1.25mL/瓶)注	ホスフルコナゾール	限		
	ブレイクシンF1000(1mg/1mL/管)注	ジノプロスト	—	劇	
	ブレイクシン(20μg/瓶)注	アルブロスタジールアルファデクス	限	劇	
	ブレイクシン注射液(20mg/2mL/管)	ブレイクシン注射液	—		

備考	薬品名	成分名	限定	区分	ハイリスク薬
	プロメチン(1mg/5mL/管)注	プロメチン	—	劇	
	プロメチン(硫酸塩)(100mg/10mL/瓶)注	プロメチン	—		
	プロメチン注(10mL/瓶)	プロメチン注射液	—		
	プロメチン注(15mL/瓶)	プロメチン注射液	—		
	プロメチン注シリンジ(13mL/筒)	プロメチンキット	—		
	プロメチン1%(1%・50mL/瓶)注	プロメチン	—	劇	Hi
	プロメチン筋注(50mg/0.5mL/筒)シリンジ	プロメチン	—		
	プロメチン筋注【100mg/1mL/筒】シリンジ	プロメチン	—		
	プロメチン(180μg/1mL/瓶)注	プロメチン-フェロニ α2a	限	劇	
	プロメチン(90μg/1mL/瓶)注	プロメチン-フェロニ α2a	限	劇	
【化療】	プロメチン(100mg/5mL/瓶)注	プロメチン	限	劇	Hi
	プロメチン点滴静注用(100mg/瓶)	プロメチン	限		
【化療】	プロメチン(1mg/瓶)注	プロメチン オゾガマイシン	限	毒	Hi
【特生】	プロメチン(960万単位/瓶)注	プロメチン-フェロニ-タ-1b	限	劇	
	プロメチン(300mg/瓶)注	プロメチン	限	劇	
	プロメチンGカリウム(100万U/瓶)注	プロメチン-フェロニカリウム	—		
【特生】	プロメチン(献血)(2.5g/瓶)注	プロメチン	—		
【特生】	プロメチン(献血)(5g/瓶)注	プロメチン	—		
	プロメチン(1000U)注	プロメチン アルファ	限		
	プロメチン(2000U)注	プロメチン アルファ	限		
	プロメチン(500U)注	プロメチン アルファ	限		
【化療】	プロメチン BS点滴注(100mg/4mL)	プロメチン	—	劇	Hi
【化療】	プロメチン BS点滴注(400mg/16mL)	プロメチン	—	劇	Hi
	プロメチン注185		—		
【瓶】	プロメチンCa(20000U/0.8mL/瓶)注	プロメチンカルシウム	—		
【5mL】	プロメチンNa(5000U/5mL/瓶)注<旧/ボ>	プロメチンNa	—		
	プロメチンNaロック用100単位(千単位/10mL/筒)注「オツカ」		—		
	プロメチンNaロック用10単位(百単位/10mL/筒)注「オツカ」	プロメチンナトリウム	—		
	プロメチンNa透析用(250単位/mL・16mL/シリンジ)「ニフ」	プロメチンNa	—		
【シリンジ】	プロメチンカルシウム(5000U/0.2mL/筒)注	プロメチンカルシウム	—		
【10mL】	プロメチンナトリウムN(10000U/10mL)注	プロメチンナトリウム	—		
【特生】	プロメチンIH静注(1000単位/5mL/瓶)	抗HBs人免疫グロブリン	—		
【特生】	プロメチン筋注用(200単位/瓶)	抗HBs人免疫グロブリン	—		
	プロメチン-IIシリンジ(0.25mL/筒)	プロメチン-II	—	劇	
	プロメチン(105mg/0.7mL/瓶)皮下注	プロメチン	限		
	プロメチン(12mg/0.4mL/瓶)皮下注	プロメチン	限		
	プロメチン(150mg/1mL/瓶)皮下注	プロメチン	限		
	プロメチン(30mg/1mL/瓶)皮下注	プロメチン	限		

備考	薬品名	成分名	限定	区分	ハイリスク薬
	ヘルパイクラ(60mg/0.4mL/瓶)皮下注	エミシス マブ	限		
	ヘルパイクラ(90mg/0.6mL/瓶)皮下注	エミシス マブ	限		
	ペラニテポ(5mg/1mL/管)注	エストラジオール吉草酸エステル	—		
【特生】	ペリナトP【非献血】(500U/10mL/瓶)	C1-インアクチベーター	限		
【特生】	ペリナト皮下注用(2000IU/瓶)	ヒトC1-インアクチベーター	限		
【化療】	ペルクイト(3mg/瓶)注	ボルトゾミブ	限	毒	Hi
	ペルザ-UW(1L/袋)		限		
	ペンゾダイン注167		—		
	ペンゾダイン注222		—		
	ペンス点静注★(400mg/瓶)	ペリマブ	限	劇	Hi
	ペンス点静注(120mg/瓶)	ペリマブ	限	劇	Hi
	ペンス皮下注(200mg/1mL/キット)オートインジェクター	ペリマブ	限	劇	Hi
	ペンス皮下注(200mg/1mL/筒)シリンジ	ペリマブ	限	劇	Hi
	ホスアプレタ点静注用(150mg/瓶)	ホスアプレタメグリン注射用	—		
	ホスカル(6000mg/250mL/瓶)注	ホスカルネットNa水和物	限	毒	
	ホストイン(750mg/10mL/瓶)注	ホスフェイトナトリウム	—	劇	
	ホスミンS(1000mg/瓶)注	ホスマイシンナトリウム	—		
	ボックスコ 皮下注用(0.4mg/瓶)	ボソリト(遺伝子組換え)注射用	限		
【筋弛緩】	ボトックス(100単位/瓶)注	A型ボツリヌス毒素	—	毒	
【筋弛緩】	ボトックス(50単位/瓶)注	A型ボツリヌス毒素	—	毒	
	ボビヨト液0.5%(500mL/本)		—		
	ボブスカイン0.25%(250mg/100mL/袋)注	レボブピバカイン塩酸塩	—	劇	Hi
	ボブスカイン0.5%(50mg/10mL/管)注	レボブピバカイン塩酸塩	—	劇	Hi
	ボブスカイン0.75%(150mg/20mL/管)注	レボブピバカイン	—	劇	Hi
	ホメビゾール(1500mg/1.5mL/瓶)注	ホメビゾール	—		
	ボラミン(5mg/1mL/管)注	クロルフェニラミン	—		
	ホリゾン(10mg/2mL/管)注	ジアゼパム	—		
	ホルベン輸液(6% 500mL/袋)	ヒドロキシエチルデンプン	—		
	ボンベントイ静注用(1300単位/瓶)	ボニコグアルファ	限		
	マーカイン(脊麻用高比重)(0.5%・20mg/4mL/管)注	ブピバカイン	—	劇	Hi
	マイザイル(50mg/瓶)注	アルグルコシターゼ	限	劇	
	マイビユー「注射用」		—		
	マイビユー注シリンジ 296		—		
	マイビユー注シリンジ 592		—		
	マイビユー注シリンジ 740		—		
【化療】	マイロターグ(5mg/瓶)点滴注	ゲムツスマブオゾガマイシン	限	毒	Hi
	マグセント(100mL/瓶)注	硫酸マグネシウム	—		
	マグセント(40mL/筒)注【シリンジ】	リュウサンマグネシウム水和物ブドウ糖キット	—		

備考	薬品名	成分名	限定	区分	ハイリスク薬
	マグネスコフ® 注シリンジ 38% (10mL/筒)	ガト® テル酸マグ® ルミン	限		
【化療】	マブ® キャンパ® ス点滴静注(30mg/1mL/瓶)	アレムツス® マブ® (遺伝子組換え)	限	劇	Hi
	マルトス(10%・500mL/袋)注	マルトース	—		
	マンニトール(20%・300mL)注	D-マンニトール	—		
	ミールビ® ック	乾燥弱毒生麻シ風シ混合ワクチン	—	劇	
	ミオMIBG-I123注射液111		—		
	ミオテクター液(500mL/組)		—		
	ミカファンギ® ンNa(50mg/瓶)注	ミカファンギ® ンナトリウム	—	劇	
	ミダゾラム(10mg/2mL/管)注	ミダゾラム	—		
【抗けいれん】	ミダフレッサ(10mg/10mL/瓶)注	ミダゾラム	限		
	ミチーガ® 皮下注用(30mg/瓶)	ネトリス® マブ® (遺伝子組換え)	限	劇	
	ミチーガ® 皮下注用シリンジ (60mg)	ネトリス® マブ® (遺伝子組換え)キット	限	劇	
	ミッドペ® リックL135(1L・8袋/箱)		限		
	ミッドペ® リックL135(1L・8袋/箱)<排液用ハッグ® 付>		—		
	ミッドペ® リックL135(2.5L・4袋/箱)	腹膜透析液(5-2)	—		
	ミッドペ® リックL135(2L・4袋/箱)<排液用ハッグ® 付>		限		
	ミッドペ® リックL250(1L・8袋/箱)		限		
	ミッドペ® リックL250(1L・8袋/箱)<排液用ハッグ® 付>		限		
	ミッドペ® リックL250(2.5L・4袋/箱)	腹膜透析液(5-4)	—		
	ミッドペ® リックL250(2L・4袋/箱)<排液用ハッグ® 付>		—		
	ミッドペ® リックL400(2L・4袋/箱)	腹膜透析液(5-6)	—		
	ミノサイクリン(100mg/瓶)注	ミノサイクリン塩酸塩静注用	—		
	ミラクリット® (5万単位/1mL/管)注	ウリナスタチン	—		
	ミルセラ®(100μg/筒)皮・注	エボ® エチンペ® ータ® ペ® ゴ® ル	—		
	ミルセラ®(150μg/筒)皮・注	エボ® エチンペ® ータ® ペ® ゴ® ル	—		
	ミルセラ®(250μg/筒)皮・注	エボ® エチンペ® ータ® ペ® ゴ® ル(遺伝子組換え)	限	劇	
	ミルリノン(10mg/10mL/管)注	ミルリノン	—	劇	
	メイロン(8.4%・20mL/管)注	炭酸水素ナトリウム	—		
	メイロン(8.4%・250mL/袋)注	炭酸水素ナトリウム	—		
	メグルダ® ーゼ® 静注用 (1000U/瓶)	ゲルカルビ® ーダ® ーゼ®	限	劇	
	メジテック1.85		—		
	メジテック3.7		—		
	メジテック925		—		
【化療】	メトトレキサート(1000mg/40mL)注	メトトレキサート	—	劇	Hi
【化療】	メトトレキサート(200mg/8mL)注	メトトレキサート	—	劇	Hi
【化療】	メトトレキサート(50mg)注	メトトレキサート	—	劇	Hi
【化療】	メトトレキサート(5mg/瓶)注	メトトレキサート	—	劇	Hi
	メチコパ® ール(500μg/1mL/管)注	メコパ® ラミン	—		

備考	薬品名	成分名	限定	区分	ハイリスク薬
	メチルエルコ [®] メトリン(0.2mg/1mL/管)注	メチルエルコ [®] メトリン	—	劇	
	メチレンブ [®] ルー(50mg/10mL/管)注	メチルチオニウム	限	劇	
	メフ [®] セグ [®] イ点滴静注液(10mg/5mL/瓶)	ヘ [®] ストロニダ [®] ーセ [®] アルファ(遺伝子組換え)	限	劇	
	メロヘ [®] ネム(250mg/瓶)注	メロヘ [®] ネム	限		
	メロヘ [®] ネム(500mg/瓶)注	メロヘ [®] ネム	限		
	メンクアット [®] フィ筋注(0.5mL/瓶)	4価髄膜炎菌ワクチン(破傷風トキソイド [®] 結	限		
	モゾ [®] ビ [®] ル(24mg/1.2mL/瓶)皮下注	ブ [®] レキサホル	限	劇	
	モルヒネ塩酸塩(10mg/1mL/管)注	モルヒネ	—	麻	Hi
	モルヒネ塩酸塩(200mg/5mL/管)注	モルヒネ塩酸塩	限	麻	Hi
	ユーロコリンズ [®] 液(465mL/瓶)		—		
【化療】	ユニツキシ(17.5mg/5mL/瓶)点滴静注	ジ [®] スツキシマフ [®] (遺伝子組換え)	限	劇	Hi
	ユルトミリスHI (300mg/3mL/瓶)点滴静注	ラブ [®] リズ [®] マフ [®] (遺伝子組換え)	限	劇	
	ヨモキ [®] 花粉 Algスクラッチ注	アレルゲ [®] ン	—		
【化療】	ヨンデ [®] リス(0.25mg/瓶)注	トラヘ [®] クテジ [®] ン	限	毒	Hi
【化療】	ヨンデ [®] リス(1mg/瓶)注	トラヘ [®] クテジ [®] ン	限	毒	Hi
	ラクテック(1000mL/袋)注	乳酸リンゲ [®] ル液	—		
	ラスリテック(1.5mg/瓶)点滴注	ラスブ [®] リカーセ [®]	限	劇	
	ラスリテック(7.5mg/瓶)点滴注	ラスブ [®] リカーセ [®]	限	劇	
	ラビ [®] アクタ(300mg/60mL/袋)注	ヘ [®] ラミビ [®] ル	限		
	ラビ [®] アクタ点滴静注液(150mg/15mL/瓶)	ヘ [®] ラミビ [®] ル水和物注射液	限		
	ラビ [®] ビ [®] ユール筋注用	乾燥組織培養不活化狂犬病ワクチン	限	劇	
	ラボ [®] ナール(300mg/12mL/管)注	チオヘ [®] ンタルナトリウム	限	劇	Hi
	ランタスXR注ゾロスター(450U/1.5mL/キット)	インスリング [®] ラルギ [®] ン	限	劇	Hi
	リコモジ [®] ユリン(12800U)注	トロノボ [®] モデ [®] ユリン アルファ	—		
【化療】	リサ付(100mg/2.5mL/瓶)注	チオテハ [®]	限	劇	Hi
	リゾ [®] ビ [®] スト注(1.6mL/瓶)	フェルカルボ [®] トラン注射液	—		
【化療】	リツキシ(100mg/10mL)注	リツキシマフ [®]	—		Hi
【化療】	リツキシ(500mg/50mL)注	リツキシマフ [®]	—		Hi
[麻酔]	リド [®] カイン塩酸塩注 (0.5%) (10mL/管)	リド [®] カイン塩酸塩注射液	—	劇	
[麻酔]	リド [®] カイン塩酸塩注 【2%】 (5mL/管)	リド [®] カイン塩酸塩注射液	—	劇	
[麻酔]	リド [®] カイン塩酸塩注<1%> (10mL/管)	リド [®] カイン塩酸塩注射液	—	劇	
	リトド [®] リン(50mg/5mL/管)注	リトド [®] リン「日医工」	—	劇	
	リネゾ [®] リド [®] (600mg/300mL/袋)注	リネゾ [®] リド [®]	限		
	リハビ [®] ックスK1号(500mL/袋)注		—		
	リハビ [®] ックスK2号(500mL/袋)注		—		
	リビ [®] オド [®] ール480注(10mL/管)	ヨード [®] 化ケシ油脂肪酸エチルエステル	—		
	リメタゾ [®] ン(2.5mg/1mL/管)注	デ [®] キサメタゾ [®] ン	—	劇	
	リュブ [®] リン(1.88mg/瓶)注	リュブ [®] ロレリン	—	劇	

備考	薬品名	成分名	限定	区分	ハイリスク薬
	リユーブ [®] リン【3.75mg/瓶】注	リユーブ [®] ロレリン	—	劇	
	リンデ [®] ロン(4mg/1mL/管)注	ベ [®] タメゾ [®] ソナトリウム	—		
	リン酸Na補正液(0.5mmol/mL・20mL/管)注	リン酸ナトリウム	—		
	ルセンティス硝子体内注射液(10mg/mL・2.3mg/0.23mL/管)注	ラニベ [®] ス [®] マブ [®] (遺伝子組換え)	限	劇	
	ルミジェブ [®] 注ミリホ [®] ンHD(300U/3mL/キット)	インスリン リスブ [®] ロ(遺伝子組換えI)キット	—	劇	Hi
	レキ [®] ユニール LCa 1.5(2.5L/袋)腹膜透析液(4袋/箱)	腹膜透析液(9-4)	限		
	レキ [®] ユニール LCa 4.25 (2L/袋) 腹膜透析液 (4袋/箱)	腹膜透析液(9-6)	限		
	レスピ [®] ア(60mg/3mL/瓶)静注	カフェインクエン酸塩	—		
	レバ [®] サ皮下注(140mg/1mL/キット)	エボ [®] ロクマブ [®] (遺伝子組換えI)キット	限		
	レブ [®] コピ [®] (2.4mg/1.5mL/瓶)筋注	エラベ [®] グ [®] アデ [®] マーゼ [®]	限		
	レベ [®] スティブ [®] 皮下注用(0.95mg/瓶)	テデ [®] ユグ [®] ルフト [®] (遺伝子組換えI)	限	劇	
	レベ [®] スティブ [®] 皮下注用(3.8mg/瓶)	テデ [®] ユグ [®] ルフト [®] (遺伝子組換え)	限	劇	
	レベ [®] ミル注フレックスベ [®] ン(300U/3mL/筒)	インスリン デ [®] テミル(遺伝子組換え)キット	—	劇	Hi
	レベ [®] ミル注ベ [®] ンフィル(300U/3mL/筒)	インスリンデ [®] テミル	限	劇	Hi
	レボ [®] カルチンFF静注(1000mg/5mL/筒)シリンジ	レボ [®] カルチンキット	—		
	レボ [®] フロキサシン(500mg/20mL/瓶)注	レボ [®] フロキサシン	限		
	レボ [®] ホリナート(100mg/瓶)注	レボ [®] ホリナートカルシウム	限		
	レボ [®] ホリナート(25mg/瓶)注	レボ [®] ホリナートカルシウム「オーハラ」	—		Hi
	レミケート [®] (100mg/瓶)注	インフリキシマブ [®]	—	劇	Hi
	レミフェンタル静注用(2mg/瓶)	レミフェンタル塩酸塩	—	麻	Hi
【化療】	ロイタチン(8mg/8mL)注	クラト [®] リビ [®] ン	限	劇	Hi
【化療】	ロイターゼ [®] (5000KU/瓶)注	アスパ [®] ラギ [®] ナーゼ [®]	—	劇	Hi
	ローハ [®] 200単位/mL(20mL/筒)注	ハ [®] ルナハ [®] リンナトリウム	—		
【筋弛緩】	ロクロウム臭化物(25mg/2.5mL/瓶)静注液	ロクロウム臭化物注射液	限	毒	Hi
【化療】	ロセ [®] ウス静注液(40mg/4mL/瓶)	ビ [®] ノルビ [®] ン酒石酸塩注射液	限	毒	Hi
	ロナブ [®] リーフ [®] 注セット【各1332mg/11.1mL/瓶】	カシリビ [®] マブ [®] /イムデ [®] ビ [®] マブ [®]	限		
	ロビ [®] オン(50mg/5mL/管)注	フルビ [®] フ [®] ロフェンアキセ	—	劇	
	ロミブ [®] レート皮下注(250μg調製用/瓶)	ロミブ [®] ロスチム	限		
	ワコ [®] スチグ [®] ミン(0.5mg/1mL/管)注	ネオスチグ [®] ミン	—	劇	
	ワソラン(5mg/2mL/管)注	ベ [®] ラバ [®] ミル	—	劇	
【化療】	ワンタキソール(80mg/4mL)注	ド [®] セタキセル	限	毒	Hi
	安息香酸ナトリウム注(1M・144.1mg/mL・20mL/瓶)	アソクコウサンNa	限		
	塩化Ca補正液(1mEq/mL/・20mL/管)	エンカカルシウム	—		
	塩化インジ [®] ウム(111In)注74		—		
	塩化タリウム(201Tl)注NMP111		—		
	塩化タリウム-Tl201注111		—		
	塩化タリウム-Tl201注射液74		—		
	塩化タリウム注(201Tl)NMP74		—		

備考	薬品名	成分名	限定	区分	ハイリスク薬
	塩化ナトリウム(10%・20mL/管)注		—		
	塩酸メトクロプラミド 注射液(10mg/2mL/管)	エンサンメトクロプラミド	—		
	乾燥まむし抗毒素注	カンソウマムシコウドクソ	限	劇	
	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タタ	—	劇	
	牛乳 Algスクラッチ注	アレルゲン	—		
	犬毛 Algスクラッチ注	アレルゲン	—		
【特生】	抗D人免疫グロブリン[非献](1000倍/2mL/瓶)注	グロブリン	—		
	小麦粉 Algスクラッチ注	アレルゲン	—		
	蒸留水(100mL/瓶)[溶]《大塚》		—		
	蒸留水(注射用)(100mL/瓶)	チュウシャヨウスイ	—		
【レジメン】	蒸留水(注射用)(100mL/瓶)	チュウシャヨウスイ	—		
	蒸留水(注射用)(1L/袋)	ジョウリュウスイ	—		
	蒸留水(注射用)(20mL/管)	チュウシャヨウスイ	—		
【レジメン】	蒸留水(注射用)(20mL/管)	チュウシャヨウスイ	—		
	蒸留水(注射用)(500mL/瓶)<細口開栓>	チュウシャヨウスイ	—		
	蒸留水(注射用)注(1L/瓶)広口開栓型	チュウシャヨウスイ	—		
	心筋保護液		—		
	水痘ワクチン(乾燥弱毒生)注	ワクチン	—	劇	
	水痘ワクチン(乾燥弱毒生)注		—	劇	
	生食注(100mL/瓶)[溶]《大塚》		—		
	生食注シリンジ (10mL/筒)		—		
	生食注シリンジ「NP」《ロクタイフ》	生理食塩液キット	—		
	生理食塩液(広口開栓)(1000mL/瓶)	セリシヨクエンエキ	—		
<洗浄用>	生理食塩液(細口開栓)(500mL/瓶)		—		
<吸入等>	生理食塩液(細口開栓)(500mL/瓶)		—		
【レジメン】	生理食塩液注 ★(250mL/袋)	セリシヨクエンエキ	—		
	生理食塩液注(100mL/瓶)	セリシヨクエンエキ	—		
【レジメン】	生理食塩液注(100mL/瓶)	セリシヨクエンエキ	—		
	生理食塩液注(1L/袋)	セリシヨクエンエキ	—		
	生理食塩液注(20mL/管)	セリシヨクエンエキ	—		
【レジメン】	生理食塩液注(20mL/管)	セリシヨクエンエキ	—		
	生理食塩液注(500mL/袋)	セリシヨクエンエキ	—		
【レジメン】	生理食塩液注(500mL/袋)	セリシヨクエンエキ	—		
	生理食塩液注(50mL/瓶)	セリシヨクエンエキ	—		
【レジメン】	生理食塩液注(50mL/瓶)	セリシヨクエンエキ	—		
	生理食塩液注★(250mL/袋)	セリシヨクエンエキ	—		
	生理食塩液注2ポート(100mL/キット)	セリシヨクエンエキチュウ	—		
	精製ツベルクリン(一般診断用)(0.25μg/瓶)注	ツベルクリン	—	劇	

備考	薬品名	成分名	限定	区分	ハイリスク薬
	組織培養不活化狂犬病ワクチン(1回分)注	ワクチン	限		
	対照液 Algスクラッチ注	アレルゲン	—		
	沈降破傷風トキソイド「生研」(0.5mL/瓶)注	沈降破傷風トキソイド	—	劇	
	鉄みょうばん水(5%・100mL/瓶)		—		
	兔毛 Algスクラッチ注	アレルゲン	—		
	糖液5%(100mL/瓶)[溶]《大塚》		—		
	日本脳炎ワクチン(0.5mL/瓶)エンセバック	ワクチン	—		
	乳酸Na補正液1mEq/mL	乳酸ナトリウム注射液	—		
	猫毛 Algスクラッチ注	アレルゲン	—		
	風しんワクチン(乾燥弱毒生)注「タダ」	フウシンワクチン	—	劇	
	風しんワクチン(乾燥弱毒生)注「タダ」		—	劇	
	麻しんワクチン(乾燥弱毒生)注	ワクチン	—	劇	
	麻しんワクチン(乾燥弱毒生)注		—	劇	
	麻しん風しん(MR弱毒生)混合ワクチン(0.7mL/瓶)		—	劇	
	無水エタノール(5mL/管)注		限		
	溶解用ブドウ糖注【5%】(20mL/管)	ブドウ糖	—		
	溶解用蒸留水(注射用)(20mL/管)	ジヨウリュウスイ	—		
	溶解用生理食塩液注(20mL/管)	セリシヨクエンエキ	—		
	卵黄 Algスクラッチ注	アレルゲン	—		
	卵白 Algスクラッチ注	アレルゲン	—		
	硫酸Mg補正液(1mEq/mL・20mL/管)	リウサンマグネシウム	—		