

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハイリスク薬
アルソマチック関節手術用灌流液(3L/袋)	乳酸リンゲル液	院内				
ウロマチックS液(3L/袋)	Dソルビトール	院内				
エムラクリーム <レーザー照射>	リドカイン・ブドウ糖配合剤	院内				
エムラクリーム <注射針穿刺>	リドカイン・ブドウ糖配合剤	院内				
クロルヘキシジンエタノール液1%(250mL/瓶)	クロルヘキシジングルコン酸塩	院内				
ビートエスエスプラス(500mL/セット)	オキシゲルチオン	院内				
レボフロキサシ点眼液(5mL)【1.5%】[先:クラビット]	レボフロキサシ	院内外				
液状フェノール(500mL)	液状フェノール	院内	内外			
蒸留水 (20mL/管)<吸入等>	注射用水	院内外				
蒸留水 (20mL/管)<洗浄用>	注射用水	院内外				
10%希釈血清点眼液(5mL/本)		院内	内外			
3%酢酸液(100mL)		院内				
3000倍ホースミン生食液(0.33mg/mL)	エビネリン	院内				
APDゆめUVフラッシュ5パック用<10>		院内外				
APD回路<小児用 7>		院内外				
APD回路<成人用 7>		院内外				
CADD-TPN輸液セット(2μ、21-7085)		院外のみ				
CAPDデイスコネクトYセット<30>		院内外				
CAPDミニキャップキット<30>		院内外				
DHT軟膏 5%(5g)		院内	内外			
EDTA-2Na点眼液(0.01M・5mL/瓶)		院内	内外			
HES40(20mL/管)		院内	内外			
KCL点滴注(1mEq/mL・20mL/管)【禁静注】	塩化カリウム	院外のみ				Hi
KN3号輸液(500mL/袋)注		院外のみ				
MS温シブ 20g(14cm×10cm・5枚/袋)	リチル酸メチル配合	院外のみ	内外			
MS冷シブ 20g(14cm×10cm・5枚/袋)	リチル酸メチル配合	院外のみ	内外			
PABA軟膏 5%		院内	内外			
SPトロチ明治	デカリウムトロチ	院内外				
TSCD ウェハ-(CD・EKW)<2>		院内				
UVフラッシュデイスコネクトYセット<30>		院内外				
UVフラッシュデイスコネクトキット<30>		院内外				
UVフラッシュデイスコネクト接続チューブ<2、T5C4325>		院内外				
UVフラッシュデイスコネクト接続チューブ<2、T5C4326>		院内外				
アイピジンUD点眼液1%(0.1mL/個)	アプロクロニジン塩酸塩	院内	内			
アイワガシ点眼液0.1%(5mL)	ブリモニジン酒石酸塩	院外のみ				
アイラミド配合懸濁性点眼液(5mL)	ブリモニジン・ブリンゾラミド	院外のみ				

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハイリスク薬
アト ^ラ ザ ^イ ム点眼液(0.58mg/5mL/本)		院内	内外			
アキチム ^ロ -ション(20mL)	ナジ ^フ ロキサ ^シ ン	院外のみ				
アキチム ^ク リーム1%(10g)	ナジ ^フ ロキサ ^シ ン	院内外				
アキチム ^軟 膏1%(10g)	ナジ ^フ ロキサ ^シ ン	院外のみ				
アキチット ^注 (500mL/袋)	サクサンイジ ^イ キ	院外のみ				
アキテム ^ラ 注(162mg/0.9mL/キット)オートインジ ^エ クター	トシリ ^マ ブ	院内外	内			Hi
アキトシ ^軟 膏3%(30g)	ブ ^ク ラテ ^シ ン	院内外	内			
アジ ^マ イシ ^ン 点眼液1%(2.5mL)	アジ ^ス ロマイシ ^ン 水和物	院内外				
アスタット ^軟 膏 1%(10g)	ラノコナゾ ^{ール}	院外のみ				
アズ ^ノ ール ^う がい液4%(10mL)	アズ ^レ ンスルホン酸ナトリウム水和物	院外のみ				
アズ ^ノ ール ^軟 膏 0.033%	ジ ^メ チルイソ ^プ ロピ ^ル アズ ^レ ン	院内外				
アセトアミノ ^フ ェン坐剤(50mg)	アセトアミノ ^フ ェン	院内外				
アセトアミノ ^フ ェン坐剤【200mg】	アセトアミノ ^フ ェン	院内外				
アセトアミノ ^フ ェン坐剤<100mg>	アセトアミノ ^フ ェン	院内外				
アセレント ^{（100μg/2mL/瓶）注}	アセレンサンナトリウム	院内外				
アダ ^リ ム ^マ ブ ^{BS} 皮下注 ^ペ ン(40mg/0.4mL/キット)「MA」	アダ ^リ ム ^マ ブ ^{（遺伝子組換）}	院内外				Hi
アデ ^イ バ ^レ ト静注用(1000単位/キット)注	ルイオクトコ ^グ アルファ ^ペ ゴ ^ル	院内外	内外			
アデ ^イ バ ^レ ト静注用(1500単位/キット)注	ルイオクトコ ^グ アルファ ^ペ ゴ ^ル	院内外	内外			
アデ ^イ バ ^レ ト静注用(2000単位/キット)注	ルイオクトコ ^グ アルファ ^ペ ゴ ^ル	院内外	内外			
アデ ^イ バ ^レ ト静注用(3000単位/キット)注	ルイオクトコ ^グ アルファ ^ペ ゴ ^ル	院内外	内外			
アド ^エ ア100 ^テ イスカス(60BL)	サロメテロール/フルチガ ^ソ ン	院内外				
アド ^エ ア250 ^テ イスカス(60BL)	サロメテロール/フルチガ ^ソ ン	院内外				
アド ^エ ア500 ^テ イスカス(60吸入用)	サロメテロール/フルチガ ^ソ ン	院外のみ				
アド ^エ ア50 ^{エア} ゾ ^{ール} (120吸入用)	サルメテロール/フルチガ ^ソ ン	院内外				
アド ^フ ィード ^パ ップ 40mg(10cm×14cm・6枚/袋)	フルビ ^フ ロ ^フ ェン	院内外				
アド ^ベ ト静注用(1500単位/キット)注	ルイオクトコ ^グ アルファ	院内外	内外			
アド ^ベ ト静注用(2000単位/キット)注	ルイオクトコ ^グ アルファ	院内外	内外			
アト ^ロ ピ ^ン 点眼液 (5mL)【1%】	アト ^ロ ピ ^ン 硫酸塩水和物	院内外				
アト ^ロ ピ ^ン 点眼液(0.25%・5mL/瓶)	アト ^ロ ピ ^ン 硫酸塩水和物	院内				
アト ^ロ ピ ^ン 点眼液(5mL/瓶)<0.5%>	アト ^ロ ピ ^ン 硫酸塩水和物	院内				
アト ^ロ ベ ^{ント} イ ^ド ゾ ^{ール} (20μg/本)	臭化イ ^ド ラ ^ト ロ ^ピ ウム	院外のみ	内			
アピ ^ド ラ ^ソ ロスター-(300U/3mL/キット)注	インスリン ^グ ル ^ジ ン	院外のみ	内			Hi
アピ ^ド ラ ^注 (100単位/mL・10mL/瓶)	インスリン ^グ ル ^ジ ン	院内外				Hi
アブ ^タ チ錠(25μg)	トリアムシノロンアセト ^ニ ド	院内外				
アミ ^ル バ ^ン (200mL/袋)注		院外のみ				
アミ ^パ レン(200mL/袋)注		院外のみ				

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハイリスク薬
アラセナA軟膏3%(5g)	ビダラピン	院内外				
アラミスト点鼻液27.5μg(56噴霧用)	フルチカゾンフランカルボニ酸	院内外				
アルト(500mg/管)	アルギン酸ナトリウム	院内外				
アルメタ軟膏(5g)	アルクロメタゾン	院内外				
アレキサル点眼液0.1%(5mL)	ベミロラストリウム	院外のみ				
アレジオンLX点眼液0.1%(5mL)	エビナスチン塩酸塩	院内外				
アロプリノール坐薬(100mg)	アロプリノール	院内	内外			
アロンアルファA(0.5g/管)	シアノアクリレート	院内外				
アンソッコウチンキ	安息香チンキ	院内外				
アンテベートクリーム0.05%(5g)	ベタメタゾン	院内外				
アンテベートローション0.05%(10g)	ベタメタゾン	院外のみ				
アンテベート軟膏0.05%(5g)	ベタメタゾン	院内外				
アンヒバ坐剤(50mg)	アセトアミノフェン	院外のみ				
アンヒバ坐剤【200mg】	アセトアミノフェン	院外のみ				
アンヒバ坐剤<100mg>	アセトアミノフェン	院外のみ				
アンペック坐剤(10mg)	モルヒネ	院内外		麻		
イオウ・カンフルローション	イオウカンフルローション	院外のみ				
イソジンゲル10%【90g】	ポピドニョート	院内外				
イソジンシュガーペースト軟膏(100g)	精製白糖・ポピドニョート	院内外	内			
イソジン液10%(250mL)	ポピドニョート	院外のみ				
イベルロン静注用(1000U/瓶)	アルブトレベノコグアルファ	院内外	内外			
イベルロン静注用(2000U/瓶)	アルブトレベノコグアルファ	院内外	内外			
イベルロン静注用(250U/瓶)	アルブトレベノコグアルファ	院内外	内外			
イベルロン静注用(500U/瓶)	アルブトレベノコグアルファ	院内外	内外			
イベル吸入粉末剤(20mg/キット)	ラニニビル	院内外				
イミグラン点鼻液(20mg/個)	スマトリプタン	院外のみ				
イロケイト注(1000U/瓶)	エフラロクトコグアルファ	院内外	内外			
イロケイト注(1500U/瓶)	エフラロクトコグアルファ	院内外	内外			
イロケイト注(2000U/瓶)	エフラロクトコグアルファ	院内外	内外			
イロケイト注(750U/瓶)	エフラロクトコグアルファ	院内外	内外			
インスリンアスパルトBS注(100単位/mL・10mL/瓶)NR	インスリンアスパルト	院内外	内			Hi
インスリンアスパルトBS注ソロスター(300単位/3mL/キット)NR	インスリンアスパルト	院内外	内			Hi
インスリンリスプロBS注(100単位/mL・10mL/瓶)HU	インスリンリスプロ(遺伝子組換)	院内外	内			Hi
インスリンリスプロBS注ソロスター(300単位/3mL/キット)HU	インスリンリスプロ	院外のみ	内			Hi
インスリングルラルギンBS注カート(300U/3mL/筒)	インスリングルラルギン	院外のみ				Hi
インスリングルラルギンBS注ミリオペン(300U/3mL/キット)	インスリングルラルギン	院内外				Hi

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハイリスク薬
インターエアゾール1mg(200噴霧/10mL)	クロモグ リクサンナトリウム	院外のみ				
インター吸入液(2mL)	クロモグ リクサンナトリウム	院外のみ				
インテバンクリーム1%(25g)	イントメタシンクリーム	院内外				
インテバン坐剤(25mg)	イントメタシン	院内外				
イントラボース(20%・100mL/袋)注	ダイユ	院外のみ				
イントラボース(20%・250mL/袋)注	ダイユ	院外のみ				
イントラボース(20%・50mL/袋)注	ダイユ	院外のみ				
ヴァイン3G(500mL/袋)注	サクサンジエキ	院外のみ				
ヴァインD(500mL/袋)注	サクサンジェルエキ	院外のみ				
ウトゲスタン腔用カプセル(200mg)	プロゲステロン	院外のみ				
ウリナスタチン腔坐剤(5000U含有)	ウリナスタチン	院内	内外			
エイプト懸濁性点眼液 1%(5mL/本)	ブリンゾラミド	院内外				
エイベリス点眼液 0.002% (2.5mL/瓶)	オミデネパグ イプロピル	院内外				
エキザルベ軟膏(5g)	混合死菌製剤	院内外				
エクストラニール (1.5L⑥)	腹膜透析液	院内				
エクストラニール (1.5L⑥) 【レギュニール用】	腹膜透析液	院内	内			
エクセルダームクリーム(10g)	スルコナゾール	院外のみ				
エクラープ ラスター(7.5cm×10cm/枚)	デプロトノプロピオン酸エステル	院外のみ				
エクリシン 眼軟膏(3.5g)	エリスロマイシン・コリスチン	院内外				
エスクレ坐剤(250mg)	抱水クロラール	院内外				
エスクレ坐剤【500mg】	抱水クロラール	院内外				
エストラーナテープ (0.18mg)	エストラジオール	院内外	内			
エストラーナテープ 「0.09mg」	エストラジオール	院外のみ	内			
エストラーナテープ 【0.72mg】	エストラジオール	院外のみ	内			
エストラーナテープ <0.36mg>	エストラジオール	院内外	内			
エタネルセプトBS皮下注ペン(50mg/1mL/キット)「MA」	エタネルセプト (遺伝子組換え)	院外のみ				Hi
エピデュオジェル(15g)	アダパレン・過酸化ベンゾイル	院内外	内			
エピペン注(0.15mg)	アドレナリン	院外のみ				
エピペン注射液【0.3mg】	アドレナリン	院内外	内			
エポプロステノール(0.5mg/瓶)「ヤンセン」静注	エポプロステノールナトリウム	院内外	内			Hi
エポプロステノール(1.5mg/瓶)「ヤンセン」静注	エポプロステノール	院内外	内			Hi
エポプロステノール「ヤンセン」専用溶解液(50mL)	生理食塩液	院外のみ				
エムラクリーム(5g)	リトカイン・プロピトカイン	院内外				
エムラパッチ	リトカイン・プロピトカイン	院内外				
エルカルチンFF静注シリンジ (1000mg/5mL/筒)	レボカルチンキット	院外のみ				
エルネオパ NF1号(1000mL/キット)点滴注		院内外				

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハイリスク薬
エルネパ [®] NF1号(1500mL/キット)点滴注		院外のみ				
エルネパ [®] NF1号(2000mL/キット)点滴注		院外のみ				
エルネパ [®] NF2号(1000mL/キット)点滴注		院内外				
エルネパ [®] NF2号(1500mL/キット)点滴注		院外のみ				
エルネパ [®] NF2号(2000mL/キット)点滴注		院外のみ				
エリジ [®] エト(2mL/筒)		院外のみ	内外			
エレメンミック注(2mL/管)	塩化マンガン・硫酸亜鉛水和物配	院外のみ				
エンブレペン(50mg/1mL/キット)注	エタネセプト(遺伝子組換え)	院内外				Hi
エンブレペン【25mg/0.5mL/キット】皮注	エタネセプト(遺伝子組換え)	院外のみ	内外			Hi
エンブレ皮注シリンジ (25mg/0.5mL/筒)	エタネセプト(遺伝子組換え)	院内外	内			Hi
オイラックスクリーム 10%(10g)	クロタミトン	院内外				
オーツカMV注		院外のみ				
オキサロローション(25μg/g・10g)	マキサカルシトール	院外のみ	内			
オキサロ軟膏(25μg/g・10g)	マキサカルシトール	院内外				
オキシ [®] ール(100mL)	オキシ [®] ール	院内外				
オキサ [®] ール錠(600mg)	オキシコナゾ [®] ール	院内外				
オクトレオト [®] (100μg/1mL/管)注	オクトレオト [®]	院内外				
オクトレオト [®] (50μg/1mL/管)注	オクトレオト [®]	院内外				
セムベ [®] ック皮下注(0.25mg/0.5mL/キット)SD	セマグ [®] ルフト [®] (遺伝子組換え)	院外のみ				Hi
セムベ [®] ック皮下注「2mg/1.5mL/筒」	セマグ [®] ルフト [®] (遺伝子組換え)	院外のみ				Hi
セムベ [®] ック皮下注SD【1.0mg/0.5mL/キット】	セマグ [®] ルフト [®] (遺伝子組換え)	院外のみ				Hi
セムベ [®] ック皮下注SD<0.5mg/0.5mL/キット>	セマグ [®] ルフト [®] (遺伝子組換え)	院外のみ				Hi
コロド [®] ル皮下注シリンジ (250μg/0.5mL/筒)	コロゴ [®] ナド [®] ト [®] ロ [®] ン [®] アル [®] ファ	院外のみ				
オフロキサ [®] ン眼軟膏(3.5g)	オフロキサ [®] ン	院内外				
オフロキサ [®] ン耳科用液(5mL)	オフロキサ [®] ン	院内外				
オリブ [®] 油(500mL)	オリブ [®] ユ	院内外				
オルプロ [®] リクス(1000単位/瓶)注	エフトレノコグ [®] アル [®] ファ	院内外	内外			
オルプロ [®] リクス静注用(3000単位/瓶)	エフトレノコグ [®] アル [®] ファ	院内外	内外			
オルベ [®] スコ100μgインヘラー-112吸入用	シクレノ [®] ド [®]	院外のみ	内			
オルベ [®] スコ200μgインヘラー-56吸入用	シクレノ [®] ド [®]	院外のみ	内			
オルベ [®] スコ50μgインヘラー-112吸入用	シクレノ [®] ド [®]	院外のみ				
オレンシア注(125mg/1mL/キット)オートインジェクター	アハ [®] タセ [®] プト	院内外	内外			Hi
オレンシア皮下注シリンジ (125mg/1mL/筒)	アハ [®] タセ [®] プト	院内外	内外			Hi
カデ [®] ックス外用散(50g/瓶)	ヨウ素	院外のみ	内			
カデ [®] ックス軟膏(0.9%:40g/本)	ヨウ素	院内外	内			
カデ [®] ックス軟膏分包(153mg:17g/枚)	ヨウ素	院外のみ	内			

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハイリスク薬
ガニレト皮下注(0.25mg/0.5mL/筒)	ガニレリクス	院外のみ				
カルチコール(425mg/5mL/管)注	カルシウム	院外のみ				
キサラン点眼液(2.5mL/本)	ラタノプロスト	院外のみ				
キシロカインゼリー 2%(30mL)	リドカイン塩酸塩	院内外				
キシロカインポンプスプレー(80g)	リドカイン	院内外				
キシロカイン液「4%」(100mL)	リドカイン塩酸塩	院内外				
キシロカイン液「4%」(20mL/瓶)	リドカイン塩酸塩	院内				
キシロカイン点眼液 4%(20mL)	リドカイン塩酸塩	院内	内			
キャブデールTSCD交換キット(5本/箱)<延長チューブ・グリーン>		院内外				
キャブデールTSCD交換キット<ウェハー・保護・延長チューブ>28入		院内外				
キャブデールTSCD交換セット(60枚×2個/セット)56入<ウェハー>		院内外				
キャブデール排液用バッグ Y(28セット/箱)[Yセット付]		院内外				
キューバル50エアゾール	プロピオン酸ベクロメタゾン	院内外				
キンダベート軟膏0.05%(5g)	クロベタゾン	院内外				
グランドテック点眼液 0.4%(5mL)	リバズビル塩酸塩水和物	院内外				
クバビット点眼液 (0.5%) (5mL)	レボフロキサシ	院外のみ				
クバビット点眼液(5mL) 【1.5%】	レボフロキサシ	院外のみ				
グランドシリンジ (150μg/0.6mL/筒)注	フィルグラストム	院外のみ	外			
グランドシリンジ (75μg/0.3mL/筒)注	フィルグラストム	院外のみ	外			
クリスピータ皮下注(10mg/1mL/瓶)	プロスマブ (遺伝子組換え)	院内外	内外			
クリスピータ皮下注(20mg/1mL/瓶)	プロスマブ (遺伝子組換え)	院内外	内外			
クリスピータ皮下注(30mg/1mL/瓶)	プロスマブ (遺伝子組換え)	院内外	内外			
グリセロール(200mL/袋)注	濃グリセリン・果糖	院外のみ				
グリセリン 滅菌(25mL)	グリセリン	院外のみ				
グリセリン(500mL)	グリセリン	院外のみ				
グリセリン浣腸ケンエ-50% L(30mL)	グリセリン	院内外				
グリセリン浣腸ケンエ-50% L 【150mL】	グリセリン	院内外				
グリセリン浣腸ケンエ-50% L<60mL>	グリセリン	院内外				
グリセリン浣腸液50% 「ムネ」 (30mL)	グリセリン	院外のみ				
グリセリン浣腸液50% 『120mL』 「ムネ」	グリセリン	院外のみ				
グリセリン浣腸液50%<60mL> 「ムネ」	グリセリン	院外のみ				
グリマザン軟膏(5g/本)	デキメタゾン・脱脂大豆タール	院外のみ	内外			
グルカゴンG/ホ (1mg/瓶)注	グルカゴン	院内外				
グレンファイン爪外用液10% (3.56g/4mL)	エフィチコゾール	院外のみ				
グロウゼト皮下注(6mg/筒)	ソマトピ	院内外				
グロウゼト皮下注 【12mg/筒】	ソマトピ	院内外				

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハイリスク薬
クオエイトMC(献血)注(1000U/瓶)【特生】	濃縮人血液凝固第8因子	院内外	内外			
クオエイトMC(献血)注(2000U/瓶)【特生】	濃縮人血液凝固第8因子	院内外	内外			
クオエイトMC(献血)注(250U/瓶)【特生】	濃縮人血液凝固第8因子	院内外	内外			
クオエイトMC(献血)注(500U/瓶)【特生】	濃縮人血液凝固第8因子	院内外	内外			
クオマイP軟膏(25g)	クロラムフェニコール・フラジ オマイシン	院内外				
クオマイ膣錠(100mg)	クロラムフェニコール	院外のみ				
クオモグ リク酸Na吸入液(2mL)	クオモグ リク酸Na	院内外				
クロラムフェニコール点眼液0.5%(5mL/瓶)	クロラムフェニコール	院内外	内			
クロラムフェニコール膣錠(100mg)	クロラムフェニコール	院内外				
クロロマ化チン軟膏2%(25g)	クロラムフェニコール	院内外				
ケイツ-N(10mg/2ml/管)注	メナテロン	院外のみ				
ゲーベンクリーム1%	スルファジ アジ ンギ ン	院内外				
ケトコナゾールクリーム2%(10g)	ケトコナゾール	院内外				
ケブザラ皮下注(200mg/キット)オートインジェクター	カリルマブ (遺伝子組換え)	院内外	内外			Hi
ケラチミンコーワクリーム20%(25g)	尿素	院外のみ				
ゲンタシン軟膏0.1%(10g)	ゲンタマイシン	院外のみ				
ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%(10g)	ゲンタマイシン	院内外				
ケンブラン吸入粉末溶解用(100mg/瓶)	メタリオン塩化物	院内	内			
セクティクス皮下注(75mg/0.5mL/筒)<シリンジ>	セクシマブ (遺伝子組換え)	院内外	内			
コソプトミニ配合点眼液(0.4mL/個)	トルゾラミド・チモールマレイン酸	院外のみ	内外			
コソプト配合点眼液(5mL)	トルゾラミド・チモールマレイン酸	院外のみ				
ゴナルエフ(75IU/瓶)注	ホルトリピンアルファ	院外のみ				
ゴナルエフ皮下注(150IU/瓶)	ホルトリピンアルファ	院外のみ				
ゴナルエフ皮下注ペン(300IU/筒)	ホルトリピンアルファ	院内外				
ゴナルエフ皮下注ペン【900IU/筒】	ホルトリピンアルファ	院内外				
ゴナルエフ皮下注ペン<450IU/筒>	ホルトリピンアルファ	院内外				
ゴナドリン(5000U/管)注	セイセンシゲキホルモン	院内外				
コバルトイ(1000U/瓶)注	オクトコグベータ	院内外	内外			
コバルトイ(2000U/瓶)注	オクトコグベータ	院内外	内外			
コバルトイ(250U/瓶)注	オクトコグベータ	院内外	内外			
コバルトイ(500U/瓶)注	オクトコグベータ	院内外	内外			
コムクロシヤンプ - 0.05%(125g)	クロータゾールプロピオン酸エステル	院外のみ				
コレクチム軟膏(0.25%)(5g)	デルゴシチン	院内外				
コレクチム軟膏(5g)【0.5%】	デルゴシチン	院内外				
コンファクトF静注用(1000単位/瓶)<高濃度>【特生】	血液凝固第VIII因子	院内外	内外			
コンファクトF静注用(250単位/瓶)<高濃度>【特生】	血液凝固第VIII因子	院内外	内外			

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハイリスク薬
コソファクトF静注用(500単位/瓶)<高濃度>【特生】	血液凝固第Ⅷ因子	院内外	内外			
コンパッククリーム5%(10g)	ウフェナート	院外のみ				
コンパック軟膏5%(10g)	ウフェナート	院外のみ				
サージカルパック口腔用	酸化亜鉛・チヨウジ油	院内				
サージセルユニット(7.6×10.2)		院内外				
サージセルユニット【15.2×22.9】		院内外				
サージセル(5.1cm×7.6cm/枚)	酸化セルロース	院内外				
サージセル綿型(5.1×2.5×2.5cm)	酸化セルロース	院内外				
サージフロ-(8mL/キット)【特生】		院内				
ザネ軟膏0.5%	ビタミンA油	院外のみ				
サーファクテン(120mg/瓶)	ハイサーファクタント	院内外				
サイプレジン点眼液(10mL)	シクロペントラート	院内外				
ザジテン点眼液 0.05%(5mL)	ケチフェン	院外のみ				
サトザルパ軟膏 10%	アエンカナンコウ	院内外				
サラゾピリン坐剤(500mg)	サラゾスルファピリジン	院外のみ				
サリチル酸ワセリン軟膏 5%	サリチルサン	院内外				
サリベートアゾール(50g/缶)	リンサンイチスイソカリウム	院内外	内			
ザルコニ液 0.01%(500mL)	ベンザルコニウム	院内外				
サルタノールインハラー-100μg(13.5mL/瓶)	サルブタモール	院内外				
サンコバ点眼液 0.02%(5mL)	シアノコバラミン	院外のみ				
サンピロ点眼液 (1%)(5mL)	ピロカルピン	院内外				
サンピロ点眼液 (5mL)【4%】	ピロカルピン	院外のみ	内			
サンピロ点眼液 (5mL)<3%>	ピロカルピン	院外のみ				
サンピロ点眼液「2%」(5mL)	ピロカルピン	院外のみ				
サンバタゾン眼耳鼻科用液 0.1%(5mL)	ベンタメタゾンリン酸エステルナトリウム	院内外				
シアノコバラミン (B12) (1000μg/1mL/管)注	シアノコバラミン	院外のみ	内外			
ジエトピロクワン-クイック(5.3mg/キット)注	ソマトピロクワン	院内外				
ジエトピロクワン-クイック注【12mg/キット】	ソマトピロクワン	院内外				
ジクアス点眼液 3%(5mL)	ジクアホルナトリウム	院外のみ	内			
ジクロフェナクナトリウム坐剤(12.5mg)	ジクロフェナクナトリウム	院内外				
ジクロフェナクナトリウム坐剤【50mg】	ジクロフェナクナトリウム	院内外				
ジクロフェナクナトリウム坐剤<25mg>	ジクロフェナクナトリウム	院内外				
ジフルカン点眼液 0.05%(5mL)	フルカナゾール	院内	内外			
ジフルプレトナートクリーム0.05%(5g)	ジフルプレトナート	院内外				
ジフルプレトナート軟膏0.05%(5g)スチフ	ジフルプレトナート	院内外				
シムジア皮下注(200mg/1mL/キット)オートクリックス	セルトリス マブ ペゴール(遺伝子組換え)	院外のみ				Hi

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハイリスク薬
シムジア皮下注射液(200mg/1mL/筒)	セルトリス マブ ペゴール(遺伝子組換)	院内外	内			Hi
シムビコートタービュヘイラ-60吸入	ブデソニド /ホルメテロール	院内外				
シヨール氏液	クエン酸	院内	内外			
シポニ-(50mg/0.5mL/筒)皮下注	ゴリムマブ	院外のみ	内外			Hi
シポニ-皮下注(50mg/0.5mL/キット)オートインジェクター	ゴリムマブ	院内外				Hi
ステリコンW液(500mL)【0.5%】	グルコンサンクロルヘキシジ ン	院内外				
ステリコンW液(500mL)<0.05%>	グルコンサンクロルヘキシジ ン	院内外				
ステリコンW液 0.02%(500mL)	グルコンサンクロルヘキシジ ン	院内外				
ストレングック(12mg/0.3mL/瓶)注	アスターゼ アルファ(遺伝子組換)	院内外	内外			
ストレングック(18mg/0.45mL/瓶)注	アスターゼ アルファ(遺伝子組換)	院内外	内外			
ストレングック(28mg/0.7mL/瓶)注	アスターゼ アルファ(遺伝子組換)	院内外	内外			
ストレングック(40mg/1mL/瓶)注	アスターゼ アルファ(遺伝子組換)	院内外	内外			
ストレングック(80mg/0.8mL/瓶)注	アスターゼ アルファ(遺伝子組換)	院内外	内外			
スピール膏M	サリチルサンパ ソウコウ	院内外				
スピリーバ 2.5 μgレスピ マット(60吸入用)	チオトリ ム臭化物水和物	院内外	内			
スプレキュア(10mL/瓶)	ブセレリン	院外のみ				
スポンゼル(5cm×2.5cm/枚)	ゼラチン	院内外				
スミスリンローション5%(30g)	フェトリン	院外のみ				
スミフェロンDS(300万U/筒)注	インターフェロン アルファ	院内外	内外			
スレンジム軟膏(10g)	スプロフェン	院外のみ				
セクターゲル 3%(25g)	ケトプロフェンゲル	院外のみ				
ゼビアックスローション2%(10g)	オゼキサシン	院外のみ				
ゼビアックス油性クリーム 2%(10g)	オゼキサシン	院外のみ				
セボフルラン吸入麻酔液「ニコー」	セボフルラン	院内				Hi
ゼルフフォームNo.12(20X60X7mm/枚)	ゼラチン	院内外				
セレント50デイスカス(60BL)	サルメテロールキシナ酸塩	院外のみ				
ソグルーヤ皮下注(5mg/1.5mL/筒)	ソマブ シタン(遺伝子組換)	院内外				
ソグルーヤ皮下注【10mg/1.5mL/筒】	ソマブ シタン(遺伝子組換)	院内外				
ゾビラックス眼軟膏 3%(5g)	アシクロビル	院内外				
ゾビラックス軟膏 5%(5g)	アシクロビル	院内外				
ソフラチュール(10cm×10cm/枚)	フラジ オマイシン	院内外				
ソマゾン(10mg/瓶)注	メセルミン(遺伝子組換え)	院内外	内外			
ソマトロピンBSシュアパール(5mg/筒)注	ソマトロピン	院内外				
ソマトロピンBSシュアパール注【10mg/筒】	ソマトロピン	院内外				
ソリクア配合注ソロスター-(300dose/3mL/キット)	インスリン グラルギ ン/リキシセチド	院内外	内外			Hi
ソリタT1号輸液(200mL/袋)点滴注		院外のみ				

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハイリスク薬
リタ3号G輸液(500mL/袋)点滴注		院外のみ				
リタ3号輸液(200mL/袋)点滴注		院外のみ				
リタックスH輸液(500mL/袋)		院外のみ				
ソル・コーテフ注射用(100mg/瓶)	ヒト [®] コルチゾ [®] ソコハク酸エステルNa	院内外	内			
ソルアセトF(500mL/袋)注	サクソリンゲ [®] ル	院外のみ				
ソルタ [®] トン注(100mg/管)注	カンレノサンカリウム	院外のみ				
ソルテム【1】輸液(500mL/袋)注	開始液	院外のみ				
ソルテム【1】輸液★<200mL/袋>注	開始液	院外のみ				
ソルテム【2】輸液(500mL/袋)注	脱水補給液	院外のみ				
ソルテム【3A G】輸液(500mL/袋)注	維持液	院外のみ				
ソルテム【3A】輸液(500mL/袋)注	維持液	院外のみ				
ソルテム【3A】輸液★<200mL/袋>注	維持液	院外のみ				
ゾルトファイ配合注フレックスタッチ(300dose/3mL/キット)	インスリンテ [®] グルテ [®] ク/リラグ [®] ルチド [®]	院内外	内外			Hi
ゾレア皮下注シリンジ(150mg/1mL/筒)	オマリズ [®] マブ [®]	院内外	内外			
タ [®] イアップ [®] 坐剤(4mg)	ジ [®] アゼ [®] ハ [®] ム	院内外			三種	
タ [®] イアップ [®] 坐剤【10mg】	ジ [®] アゼ [®] ハ [®] ム	院内外			三種	
タ [®] イアップ [®] 坐剤<6mg>	ジ [®] アゼ [®] ハ [®] ム	院内外			三種	
タ [®] イアニール PD4/4.25 シングル(2.0L④)	腹膜透析液	院内外				
タ [®] イアニールN PD4-1.5 UV ツイン(1.0L⑥)	腹膜透析液	院内				
タ [®] イアニールN PD4-1.5 シングル(1.0L⑧)	腹膜透析液	院内				
タ [®] イアニールN PD4-1.5 シングル(1.5L⑥)	腹膜透析液	院内				
タ [®] イアニールN PD4-1.5 シングル(2.0L④)	腹膜透析液	院内				
タ [®] イアニールN PD4-1.5 シングル(2.5L④)	腹膜透析液	院内				
タ [®] イアニールN PD4-1.5 シングル(5.0L②)	腹膜透析液	院内				
タ [®] イアニールN PD4-2.5 UV ツイン(1.0L⑥)	腹膜透析液	院内				
タ [®] イアニールN PD4-2.5 UV ツイン(2.0L④)	腹膜透析液	院内				
タ [®] イアニールN PD4-2.5 シングル(1.0L⑧)	腹膜透析液	院内				
タ [®] イアニールN PD4-2.5 シングル(1.5L⑥)	腹膜透析液	院内				
タ [®] イアニールN PD4-2.5 シングル(2.0L④)	腹膜透析液	院内				
タ [®] イアニールN PD4-2.5 シングル(2.5L④)	腹膜透析液	院内				
タ [®] イアニールN PD4-2.5 シングル(5.0L②)	腹膜透析液	院内				
タ [®] イアモックス(500mg/瓶)注	アセタ [®] ラミト [®] ナトリウム	院外のみ				
タコシール組織接着用シート(9.5cm×4.8cm)【特生】	フィブ [®] リンゲ [®] ン配合剤	院内				
タフ [®] コム配合点眼液(2.5mL/本)	タフル [®] ロスト [®] ・チモロールマレイン酸塩	院外のみ				
タフ [®] ロスミン点眼液0.0015%(0.3mL/個)	タフル [®] ロスト	院外のみ				
タラシンTゲ [®] ル(1%:10g/本)	リン酸クリンダ [®] マイシン	院内外				

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハイリスク薬
クビット 眼軟膏(3.5g)	オフロキサシン	院外のみ				
クビット 耳科用液(5mL)	オフロキサシン	院外のみ				
タリムス点眼液 0.1%(5mL)	タクロリムス	院外のみ	内			
チアマール水0.025%(500mL)	塩化ベンザルコニウム	院内外				
チモール点眼液 (0.25%) (5mL)	チモール	院外のみ				
チモール点眼液 (5mL) 【0.5%】	チモール	院内外				
ティフェリンゲル0.1%(15g)	アダパレン	院内外				
テキマタゾン 【口腔用】 軟膏0.1%(5g)	テキマタゾン	院内外				
テストステロン軟膏 5%	テストステロン	院内	内			
テスモレリンスプレー10 (5mL/瓶)	テスモレリン酢酸塩水和物	院内外	内			
テスモレリン点鼻スプレー2.5µg(125µg/瓶)	テスモレリン酢酸塩水和物	院内外				
テスモレリン点鼻液(100µg/mL) (2.5mL/瓶)	テスモレリン酢酸塩水和物	院外のみ				
テタトル点眼液0.01%(5mL/瓶)	ブナゾシン	院外のみ	内外			
テトラサイクリン・プレステロン 【歯科用】 軟膏(5g/本)	テトラサイクリン・エビジヒドロコレステリン	院内				
テヒドロコール酸(10%・1000mg/10mL/管)注	テヒドロコール酸	院外のみ				
テュオトラバ 配合点眼液(2.5mL)	トラボフロスト・チモールマレイン酸塩	院外のみ				
テュピケント皮下注シリンジ (300mg/2mL/筒)	テュピルマブ	院内外	内外			
テュピケント皮下注ペン(300mg/2mL/キット)	テュピルマブ	院内外	内外			
テュロテップ MTパッチ (2.1mg/枚)	フェンタニル	院外のみ		麻		
テュロテップ MTパッチ 【4.2mg/枚】	フェンタニル	院内外		麻		
テラマイシン 軟膏(ポリミキシンB含有)(25g)	オキシテトラサイクリン	院外のみ				
テルヘートスカルプローション0.05%(10g)	クロヘタゾール	院外のみ				
テルヘート軟膏0.05%(5g)	クロヘタゾール	院内外				
テレミンツグ坐薬(2mg)	ピサコジル	院内外				
テレミンツグ坐薬 【10mg】	ピサコジル	院内外				
トービー吸入液(300mg/5mL/管)	トブラマイシン	院内外	内外			
トプシムE クリーム(5g)	フルオシノニド	院外のみ				
トブラシン点眼液 0.3%(5mL)	トブラマイシン	院内外				
トボネックス軟膏(10g)	カルシトリオール	院外のみ				
トボベットゲル(15g/本)	カルシトリオール・ヘタメタゾンジプロ	院外のみ				
トボベットフォーム(60g/本)	カルシトリオール・ヘタメタゾンジプロ	院外のみ				
トボベット軟膏(15g)	カルシトリオール・ヘタメタゾンジプロ	院外のみ				
トルゾプト点眼液(0.5%・5mL)	トルゾラミド	院外のみ				
トルゾプト点眼液(5mL) 【1%】	トルゾラミド	院外のみ				
トレシーバ フレックスタッチ(300U/3mL/キット)注	インスリンデグルデク	院内外	内			Hi
トレシーバ ペンフィル(300U/3mL/筒)注	インスリンデグルデク	院外のみ	内			Hi

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハイリスク薬
ドレゾンテープ (7.5cm×10cm/枚)	フルドキシコルチド	院内外				
トレブロスト(100mg/20mL/瓶)注	トレブロステコル	院内外	内外			Hi
トレブロスト(200mg/20mL/瓶)注	トレブロステコル	院内外	内外			Hi
トレブロスト(20mg/20mL/瓶)注	トレブロステコル	院内外	内外			Hi
トレブロスト(50mg/20mL/瓶)注	トレブロステコル	院内外	内外			Hi
トロンビン液モチダ 5千(5000U/5mL/キット)	トロンビン	院内				
ナセリン坐剤(10mg)	ドンパリドン	院内外				
ナセリン坐剤【60mg】	ドンパリドン	院外のみ				
ナセリン坐剤<30mg>	ドンパリドン	院内外				
ナゾネックス点鼻液 50μg(56噴霧用)	モメタゾンフランカルボキシ酸	院外のみ				
ニコチルTTS 10 (17.5mg/枚)	ニコチン	院外のみ				
ニコチルTTS 20 (35mg/枚)	ニコチン	院外のみ				
ニコチルTTS 30 (52.5mg/枚)	ニコチン	院外のみ				
ニコペリック(1.5L・4袋/箱)	腹膜透析液	院内外				
ニゾラルクリーム2%(10g)	ケトコナゾールクリーム	院内外	内			
ニゾラルローション(2%・10g)	ケトコナゾール	院外のみ				
ヌーイック静注用(1000単位/瓶)	シモクトコグアルファ	院内外	内外			
ヌーイック静注用(2000単位/瓶)	シモクトコグアルファ	院内外	内外			
ヌーイック静注用(250単位/瓶)	シモクトコグアルファ	院内外	内外			
ヌーイック静注用(500単位/瓶)	シモクトコグアルファ	院内外	内外			
耐アミュー(200mL/袋)注		院外のみ				
耐キシテープ (73.5mg)	オキシブチニン	院外のみ	内			
耐ブロー氏液(AI濃度1.7% 10ml/本)		院内	内外			
耐メドロールEE軟膏(3g)	フラジマイシン・メチルプレドニゾン	院内外				
ネリゾナユニバールクリーム0.1%(10g)	ジフルコルトロン	院外のみ				
ネリゾナ軟膏(5g)	ジフルコルトロン	院外のみ				
ネリプロクト坐剤	ジフルコルトロン・リドカイン	院外のみ				
パウトM(2000U)静注【特生】	濃縮人血液凝固第9因子	院内外	内外			
パオイト(1500単位/瓶)注	ツロクトコグアルファ	院内外	内外			
パオイト(500単位/瓶)注	ツロクトコグアルファ	院内外	内外			
パオセブンHIシリンジ (1mg/瓶)注	エプトコグアルファ	院内外	内外			
パオセブンHIシリンジ (2mg/瓶)注	エプトコグアルファ	院内外	内外			
パオラビット 30ミックス注ペンシル(300U/3mL/筒)	インスリンアスパルト(遺伝子組換え)	院外のみ	内			Hi
パオラビット 注(100単位/mL・10mL/瓶)	インスリンアスパルト(遺伝子組換え)	院内外	内			Hi
パオラビット 注フレックスタッチ(300U/3mL/筒)	インスリンアスパルト(遺伝子組換え)	院外のみ				Hi
パオラビット 注フレックスペン(300U/3mL/筒)	インスリンアスパルト(遺伝子組換え)	院外のみ				Hi

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハイリスク薬
ボラベッド注ペンシル(300U/3mL/筒)	インスリンアスパルト(遺伝子組換え)	院内外				Hi
ルデイトピンフレックスプロ(5mg/筒)注	ソマトピン(遺伝子組換え)	院内外				
ルデイトピンフレックスプロ注【10mg/筒】	ソマトピン(遺伝子組換え)	院内外				
ハイカリック3号注(700mL/袋)		院外のみ	内外			
ハイカリックNC-L注(700mL/袋)		院外のみ	外			
ハイクット配合注【特生】	人血液凝固第10因子加活	院内外	内外			
ハイセントラ【非献血】(20%・1g/5mL/瓶)注【特生】	グロブリン	院内外	内外			
ハイセントラ【非献血】(20%・2g/10mL/瓶)注【特生】	グロブリン	院内外	内外			
ハイセントラ【非献血】(20%・4g/20mL/瓶)注【特生】	グロブリン	院内外	内外			
ハイドロキノン軟膏 2%		院内	内外			
ハイドロキノン軟膏【5%】		院内	内外			
ハイパジールコート点眼液(0.25%・5mL)	ニプロラジール	院外のみ	内外			
バクスマー点鼻粉末剤(3mg)	ゲルカゴン	院内外				
バクトロバン鼻腔用軟膏 2%(3g)	ムピロシムカルシウム水和物	院内外				
パスタロンソフト軟膏 10%(20g)	ニョウソ	院内外				
パスタロンローション 10%(20g)	ニョウソ	院外のみ				
パタノール点眼液 0.1%(5mL)	塩酸オロパタジン	院外のみ				
バッグフリー-SL<排液バッグ 28>		院内外				
バッグフリー-SL-W<キャップ 28>		院内外				
パッチテストパネル(S)(2枚/組)	パッチテスト用	院内				
パッチテスト試薬金属 塩化亜鉛2%(5g/瓶)	パッチテスト用塩類	院内				
パッチテスト試薬金属 臭化銀2%(5g/瓶)	パッチテスト用塩類	院内				
パッチテスト試薬金属 硫酸銅1%(5mL/本)	パッチテスト用塩類	院内				
パピロックミニ点眼液0.1%(0.4mL/本)	シクロスポリン	院内外	内			
パベカシン点眼液 0.5%(5mL)	アルベカシン	院内	内外			
パラマイシン軟膏	パラシトリン・フラジホマイシン	院内外				
パルミコート100μgタービュヘイラ-112吸入	ブデソニド	院外のみ				
パルミコート200μgタービュヘイラ-56吸入	ブデソニド	院内外				
パルミコート吸入液(0.25mg/2mL/管)	ブデソニド	院外のみ				
パルミコート吸入液【0.5mg/2mL/管】	ブデソニド	院内外				
パソコマイシン眼軟膏(1%:5g/本)	パソコマイシン	院内外	内外			
パントール(100mg/1mL/管)注	パントール	院外のみ				
ヒアルロン酸Na 0.85眼粘弾剤1%	精製ヒアルロン酸ナトリウム	院内				
ヒアルロン酸ナトリウム点眼液 0.1%(5mL/瓶)	精製ヒアルロン酸ナトリウム	院内外				
ヒアレインミニ点眼液(0.4mL/個)【0.3%】	精製ヒアルロン酸ナトリウム	院内外	内			
ヒアレインミニ点眼液 0.1%(0.4mL/個)	精製ヒアルロン酸ナトリウム	院外のみ				

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハイリスク薬
ヒアレイン点眼液 0.1%(5mL/瓶)	精製ヒアルロン酸ナトリウム	院外のみ				
ピ-エヌイン1号(1000mL/キット)注		院外のみ				
ピ-エヌイン2号(1100mL/キット)注		院外のみ				
ピ-エヌイン3号(1200mL/キット)注		院外のみ				
ピ-フリード 輸液(500mL/袋)		院外のみ				
ピ-チン(1mg/2mL/管)注	ピ-チン	院外のみ	内外			
ピ-カーボン(500mL/袋)注	重炭酸リンゲル液	院外のみ				
ピ-クトザ 皮下注シリンジ (18mg/3mL/筒)	リラグルト	院外のみ				
ピ-スラーゼ VitB2(10mg/1mL/管)注	リボフラビンナトリウム	院外のみ				
ピ-ソノテブ (4mg)	ピ-ソノテブ	院内外	内			
ピ-ソルボ 吸入液(45mL)	ブ-ロムヘキシン吸入	院外のみ				
ピ-タジエト注(2筒/キット)		院外のみ				
ピ-タジミンVitC(100mg/1mL/管)注	アスコルビン酸	院外のみ				
ピ-タジミンVitC(100mg/1mL/管)注	アスコルビン酸	院外のみ				
ピ-タジミン(1瓶)注		院外のみ				
ピ-テュリオン(2mg/キット)注 ^ペ ン	エキセチル	院外のみ	内外			Hi
ピ-マリシ5%点眼液 5%(5mL)	ピ-マリシ	院外のみ				
ピ-マリシ眼軟膏1% (5g/本)	ピ-マリシ	院内外	内			
ヒューマトロブ 注(6mg/筒)	ソマトロピン	院内外				
ヒューマトロブ 注【12mg/筒】	ソマトロピン	院内外				
ヒューマリン3/7カート(300U/3mL/筒)皮注	インスリンヒト(遺伝子組換え)	院外のみ				Hi
ヒューマリンNカート(300U/3mL/筒)皮注	インスリンヒト(遺伝子組換え)	院外のみ				Hi
ヒューマリンNミリオペン(300U/3mL/キット)注	インスリンヒト(遺伝子組換え)	院外のみ	内			Hi
ヒューマリンN注(100単位/mL・10mL/瓶)	インスリンヒト(遺伝子組換え)	院外のみ				Hi
ヒューマリンRカート(300U/3mL/筒)皮注	インスリンヒト(遺伝子組換え)	院外のみ				Hi
ヒューマリンR注(100単位/mL・10mL/瓶)	インスリンヒト(遺伝子組換え)	院内外				Hi
ヒューマリンR注ミリオペン(300U/3mL/キット)皮注	インスリンヒト(遺伝子組換え)	院内外	内外			Hi
ヒューマログ (パ-イアル)注(100単位/mL・10mL/瓶)	インスリンリスプロ(遺伝子組換え)	院内外	内			Hi
ヒューマログ ミックス50注カート	インスリンリスプロ(遺伝子組換え)	院外のみ				Hi
ヒューマログ 注カート(300U/筒)	インスリンリスプロ(遺伝子組換え)	院内外				Hi
ヒューマログ 注ミリオペン(300U/3mL/キット)	インスリンリスプロ(遺伝子組換え)	院外のみ	内			Hi
ヒューマログ 注ミリオペン【HD】(300U/3mL/キット)	インスリンリスプロ(遺伝子組換え)	院外のみ				Hi
ヒューミラ皮下注シリンジ (20mg/【0.2mL】/筒)	アダリマブ(遺伝子組換え)	院内外	内			Hi
ヒューミラ皮下注 ^ペ ン(40mg/0.4mL/キット)	アダリマブ(遺伝子組換え)	院内外				Hi
ヒューミラ皮下注 ^ペ ン(80mg/0.8mL/キット)	アダリマブ(遺伝子組換え)	院外のみ	内外			Hi
ヒルト-イト ソフト軟膏0.3% (50g)	ヘパリン類似物質	院内外	内			

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハイリスク薬
ヒルト [®] イト [®] ソフト軟膏0.3% <100g>	ヘパ [®] リン類似物質	院内外	内			
ヒルト [®] イト [®] ソフト軟膏0.3% 「25g」	ヘパ [®] リン類似物質	院外のみ				
ヒルト [®] イト [®] ソフト軟膏0.3% 【500g】	ヘパ [®] リン類似物質	院内外	内			
ヒルト [®] イト [®] ローション0.3%(25g)	ヘパ [®] リン類似物質	院内外	内			
ヒルト [®] イト [®] クリーム 0.3%(25g)	ヘパ [®] リン類似物質	院外のみ				
ヒルト [®] イト [®] フォーム0.3%(92g)	ヘパ [®] リン類似物質	院外のみ				
ピレノキシ [®] 懸濁性点眼液0.005%(5mL)	ピレノキシ [®]	院外のみ				
ファイバ [®] 【非献血】注(1000U/瓶)【特生】	人血液凝固因子抗体迂回活性	院内外	内外			
ファイアスプ [®] 注(100単位/mL・10mL/瓶)	インスリン アスパ [®] ルト	院内外	内			Hi
ファイアスプ [®] 注フレックスタッチ(300U/3mL/キット)	インスリン アスパ [®] ルト	院内外				Hi
ファイアスプ [®] 注ペンフィル(300U/3mL/筒)	インスリン アスパ [®] ルト	院外のみ				Hi
ファイラ [®] ラストスプレー(250μg)	トラフェルミン	院内外				
ファイラジ [®] 皮下注シリンジ (30mg/3mL/筒)	イカバ [®] ト	院内外	内外			
フィルグ [®] ラスチムBS(150μg/0.6mL/筒)注「F」	フィルグ [®] ラスチム後続1	院内外	外			
フィルグ [®] ラスチムBS(75μg/0.3mL/筒)注「F」	フィルグ [®] ラスチム後続1	院内外	外			
フェノール亜鉛華リニメント	フェノールアエンカリニメント	院内外				
フェロン(100万U/瓶)注	インターフェロンベータ	院内外				
フェロン(300万U/瓶)注	インターフェロンベータ	院内外				
フェントステープ [®] 「1mg/枚」	フェンタニルケエン酸塩	院内外	内	麻		
フェントステープ [®] 「1mg/枚」【慢】	フェンタニルケエン酸塩	院内外	内外	麻		
フェントステープ [®] (0.5mg/枚)	フェンタニルケエン酸塩	院内外		麻		
フェントステープ [®] (0.5mg/枚)【慢】	フェンタニルケエン酸塩	院内外	内外	麻		
フェントステープ [®] <4mg/枚>	フェンタニルケエン酸塩	院外のみ	内外	麻		
フェントステープ [®] <4mg/枚> 【慢】	フェンタニルケエン酸塩	院外のみ	内外	麻		
フォルテオ(600μg/キット)注	テリパチド [®]	院内外	内外			
フジソ [®] 軟膏2%(10g)	フジソ [®] ナトリウム	院内外				
ブデソニド [®] 吸入液(0.25mg/2mL/管)[先:パルミコート]	ブデソニド [®]	院内外				
ブデソニド [®] 吸入液[先:パルミコート] 【0.5mg/2mL/管】	ブデソニド [®]	院内外				
ブドウ糖注(200mL/袋) 【50%】	ブドウ糖	院外のみ				
ブドウ糖注(20mL/管) 【50%】	ブドウ糖	院外のみ				
ブドウ糖注 【10%】 (20mL/管)	ブドウ糖	院外のみ				
ブドウ糖注 【10%】 (500mL/瓶)	ブドウ糖	院外のみ				
ブドウ糖注 【20%】 (20mL/管)	ブドウ糖	院外のみ				
ブドウ糖注 【5%】 (100mL/瓶)	ブドウ糖	院外のみ				
ブドウ糖注 【5%】 (200mL/袋)	ブドウ糖	院外のみ				
ブドウ糖注 【5%】 (20mL/管)	ブドウ糖	院外のみ				

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハイリスク薬
ブドウ糖注【5%】(500mL/瓶)	ブドウ糖	院外のみ				
ブドウ糖注【5%】<50mL/瓶>	ブドウ糖	院外のみ				
フラジール錠(250mg)	メロニタゾール	院外のみ	内			
プラスチック	ポリエチレン樹脂・流動パラフィン	院内外				
フラビタ眼軟膏(5g)	フラビニオンジメチルオクト	院内外				
フラビタ点眼液(5mL)	フラビニオンジメチルオクト	院外のみ				
フラントルテープ(40mg/枚)	硝酸イソルビド	院内外	内外			
フリビナ液 0.05%(500mL)	ナファゾリン硝酸塩	院内外				
フリビナ点鼻 2倍希釈液(10mL)(生食で希釈)	ナファゾリン硝酸塩	院内外				
フリビナ点鼻 3倍希釈液(10mL)(生食で希釈)	ナファゾリン硝酸塩	院内外				
フリビナ点鼻液(製品原液)(10mL)	ナファゾリン硝酸塩	院内外				
ブリモジソ酒石酸塩点眼液0.1% [先:アイワゴン]	ブリモジソ	院内外				
フルカリック1号(903mL)点滴注		院外のみ	内外			
フルカリック2号(1003mL)注		院外のみ	内外			
フルタイト100マイカス(100μg×60BL)	フルチカゾンプロピオン酸エステル	院内外				
フルタイト200マイカス(200μg×60BL)	フルチカゾンプロピオン酸エステル	院内外				
フルタイト50マイカス(50μg×60BL)	フルチカゾンプロピオン酸エステル	院内外				
フルタイト50マイカス(50μg×60BL)	フルチカゾンプロピオン酸エステル	院内外				
フルタイトマイカス(60吸入用)【100μg】	フルチカゾンプロピオン酸エステル	院外のみ	外			
フルティフォーム125マイカス(120吸入用)	フルチカゾン・ホルモテロール	院外のみ				
フルティフォーム50マイカス(120吸入用)	フルチカゾン・ホルモテロール	院外のみ				
フルティフォーム125マイカス(56吸入用)	フルチカゾン・ホルモテロール	院外のみ	内			
フルティフォーム50マイカス(56吸入用)	フルチカゾン・ホルモテロール	院外のみ				
フルナーゼ点鼻液(56噴霧用)【50μg】	フルチカゾンプロピオン酸エステル	院外のみ				
フルナーゼ点鼻液小児用(25μg)(56噴霧用)	フルチカゾンプロピオン酸エステル	院内外				
フルメタ軟膏(5g)	モメタゾン	院外のみ				
フルメロン点眼液(0.02%)(5mL)	フルオロメロン	院内外				
フルメロン点眼液(5mL)【0.1%】	フルオロメロン	院内外				
フルモザイム吸入液(2.5mg/2.5mL/管)	トルナーゼアルファ	院内	内外			
ブレイミンP(200mL/袋)注		院外のみ				
ブレイミンP点眼液(1mg)	ゲメプロスト	院内	内外			
ブレイミンP点眼液(5g/本)	ブレイミンP	院内外	内			
ブレイミンP注腸(20mg/60mL/個)	リン酸ブレイミンP	院内外				
ブレイミンP(5mL/キット)【特生】		院内				
ブレイミンP液(30mL)	カルプロニウム	院外のみ				
ブレイミンP軟膏0.003%(10g/本)	アルプロスタジール	院内外				

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハイリスク薬
プロピック軟膏(5g)【0.1%】	タロリス水和物	院内外				
プロピック軟膏小児用(0.03%)(5g)	タロリス水和物	院内外				
プロナック点眼液(5mL/瓶)	プロムフェナクナトリウム	院内外				
プロペト	ワセリン	院内外				
プロムヘキシン塩酸塩吸入液(45mL)[先:ピソルボソ]	プロムヘキシン	院内外				
プロト D クリーム1%(10g)	ミコナゾール	院外のみ				
ヘキサックAL 1%綿棒12	クロルヘキシジングルコン酸塩	院内外				
ヘキソクリーム 0.5%(10g)	アモロフィン	院外のみ				
ヘストン耳鼻科用 1%(50mL)	セフェメキシム	院内外				
ヘストン耳鼻科用 1%(5mL)	セフェメキシム	院外のみ				
ヘストン点眼用 0.5%(5mL)	セフェメキシム	院内外				
ヘセルクリーム5%(250mg/包)	イキモト	院外のみ	内外			
ヘタフェロン(960万単位/瓶)注【特生】	インターフェロンベータ-1b	院内外	内外			
ヘタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12% (5g) [先:リンデロンV]	ヘタメタゾン	院内外				
ヘトネートNクリーム(5g/本)	ヘタメタゾン吉草酸エステル・フラジオマイ	院外のみ				
ヘトネートN軟膏(5g)	ヘタメタゾン吉草酸エステル・フラジオマイ	院外のみ				
ヘトパールG軟膏(5g)	ヘタメタゾン吉草酸エステル・フラジオマイ	院外のみ				
ヘトプティック点眼液(0.5%・5mL)	ヘタキノロール	院外のみ				
ヘトパスタ軟膏4%	ジフェニヒドラミン	院内外				
ヘネリン吸入液(30mL)	サルブタモール	院内外				
ヘネフィクス(1000U)注	ノコグアルファ	院内外	内外			
ヘネフィクス(2000U)注	ノコグアルファ	院内外	内外			
ヘネフィクス(500U)注	ノコグアルファ	院内外	内外			
ヘノキール点眼液 0.4%(10mL)	オキシプロカイン	院内外				
ヘパフラッシュ100単位(千単位/10mL/筒)注	ヘパリンナトリウム	院外のみ				
ヘパフラッシュ10単位(百単位/10mL/筒)注	ヘパリンナトリウム	院外のみ				
ヘパリンNa(5000U/5mL/瓶)注<旧:ホヘパ>【5mL】	ヘパリンナトリウム	院外のみ				
ヘパリンNaロック用100単位(千単位/10mL/筒)注	ヘパリンナトリウム	院内外				
ヘパリンNaロック用10単位(百単位/10mL/筒)注	ヘパリンナトリウム	院内外				
ヘパリンカルシウム(5000U/0.2mL/筒)注【シリンジ】	ヘパリンカルシウム	院内外				
ヘパリンナトリウムN(10000U/10mL)注【10mL】	ヘパリンナトリウム	院外のみ				
ヘパリン類似物質クリーム0.3%(25g)	ヘパリン類似物質	院外のみ				
ヘパリン類似物質ローション0.3% (50g/本)	ヘパリン類似物質	院外のみ				
ヘパリン類似物質外用【泡状】スプレー0.3% (100g/本)	ヘパリン類似物質	院内外				
ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%(100g/本)	ヘパリン類似物質	院外のみ				
ヘパリン類似物質油性クリーム 0.3%(25g)	ヘパリン類似物質	院内外				

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハイリスク薬
ヘパリン類似物質油性剤-0.3% <100g>	ヘパリン類似物質	院内外				
ヘパリン類似物質油性剤-0.3% 【500g】	ヘパリン類似物質	院内外				
ベピガール(2.5%・15g/本)	ベゾール	院外のみ	内			
ヘムライブ ー(105mg/0.7mL/瓶)皮下注	エミスマブ	院内外	内外			
ヘムライブ ー(150mg/1mL/瓶)皮下注	エミスマブ	院内外	内外			
ヘムライブ ー(30mg/1mL/瓶)皮下注	エミスマブ	院内外	内外			
ヘムライブ ー(60mg/0.4mL/瓶)皮下注	エミスマブ	院内外	内外			
ヘムライブ ー(90mg/0.6mL/瓶)皮下注	エミスマブ	院内外	内外			
ヘモリゾン軟膏(2g)	ダ イョウキン	院内外				
ヘリナト皮下注用(2000IU/瓶)<皮下注> 【特生】	ヒトC1-インアクチベーター	院内外	内			
ヘリプ ラストPコンビ セット(1mL) 【非献血】 【特生】	フィブリゲン加第13因子	院内				
ヘリプ ラストPコンビ セット(3mL) 【非献血】 【特生】	フィブリゲン加第13因子	院内				
ペンサ坐剤(1g/個) 【坐剤】	メサジン	院内外	内			
ペンサ注腸(1g/個)	メサジン	院外のみ				
ペント化ス吸入液(10μg/1mL/管)	イロprost	院内外	内外			
ペソリス皮下注(200mg/1mL/キット)オートインジェクター	ベリマブ	院内外	内外			Hi
ペソリス皮下注(200mg/1mL/筒)シリンジ	ベリマブ	院外のみ	内外			Hi
ペソステブ (18mg/枚)	リトカイン	院内				
ホームPDシステム つなぐセットキャップ キット<30,JPC4222K>		院内				
ホリンV腫用錠(1mg)	エストリオール	院外のみ				
ホクナリン テーブ (0.5mg)	ツロブテロール	院内外				
ホクナリン テーブ 【2mg】	ツロブテロール	院内外				
ホクナリン テーブ <1mg>	ツロブテロール	院内外				
ホスミンS耳科用(300mg/10mL)	ホソマイシンナトリウム	院外のみ				
ホスミン液(0.1%・100mL)	エピネフリン	院内外				
ホスミン吸入用(10mL/瓶)	エピネフリン	院内				
ホチシート(10cm×15cm・3枚/袋)	アエンカナンコウ	院外のみ				
ホビト ンオート ガール7%(30mL)	ホビト ンオート	院内外				
ホビト ンオート ガール10%(4g)	ホビト ンオート	院内外				
ホビト ン液0.5%(500mL/本)	ホビト ンオート	院内				
ホビト ン液10%(250mL)	ホビト ンオート	院内外				
ホラザン G坐剤	トリベノジド・リトカイン	院内外	内			
ホルタレンゲール1% 【50g】	ジクロフェナクナトリウム	院外のみ	内外			
ホルタレン坐剤(12.5mg)	ジクロフェナクナトリウム	院外のみ				
ホルタレン坐剤 【50mg】	ジクロフェナクナトリウム	院外のみ				
ホルタレン坐剤<25mg>	ジクロフェナクナトリウム	院外のみ				

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハイリスク薬
ホルビックス(2mL/管)注	エンカマンガリユウサン	院外のみ				
ホルベシオン輸液(6% 500mL/袋)	ヒドロキシエチルステアリン	院外のみ				
ホソアルファローション2μg(10g)	タカシトール	院外のみ				
ホソアルファ軟膏 2μg/g(10g)	タカシトール	院外のみ				
ホソプチューブセットニブ		院外のみ				
ホソプチューブセットニブ(TS-P541)		院外のみ				
ホソペンテイル静注用(1300単位/瓶)	ホニコグアルファ	院内外	内外			
マイコスボールクリーム1%(10g)	ヒドロコル	院外のみ				
マイザールクリーム0.05%(5g)	ジフルレトナート	院内外	内			
マイザール軟膏0.05%(5g)	ジフルレトナート	院内外	内			
マイホムピコセット(7セット/箱)		院内外				
マイホムピコセット(7セット/箱)[小容量]		院内外				
マグネール(20mL/管)注	硫酸マグネシウム	院外のみ				
マスクンWエタノール液 0.5%(500mL)	グルコンサンクロルヘキシジン	院内外				
ミカファンギンナトリウム点眼液0.1%(5mL)	ミカファンギン	院内	内外			
ミケラン点眼液(1%)(5mL/瓶)	カルテオロール	院外のみ				
ミケラン点眼液(5mL/瓶)【2%】	カルテオロール	院外のみ				
ミケラン配合点眼液(2.5mL/本)	カルテオロール塩酸塩・ラタノロスト	院外のみ				
ミットペリックL135(1L・8袋/箱)	腹膜透析液	院内外				
ミットペリックL135(1L・8袋/箱)<排液用バッグ付>	腹膜透析液	院内外				
ミットペリックL135(2.5L・4袋/箱)	腹膜透析液	院内外				
ミットペリックL135(2L・4袋/箱)	腹膜透析液	院内外				
ミットペリックL135(2L・4袋/箱)<排液用バッグ付>	腹膜透析液	院内外				
ミットペリックL250(1L・8袋/箱)	腹膜透析液	院内外				
ミットペリックL250(1L・8袋/箱)<排液用バッグ付>	腹膜透析液	院内外				
ミットペリックL250(2.5L・4袋/箱)	腹膜透析液	院内外				
ミットペリックL250(2L・4袋/箱)	腹膜透析液	院内外				
ミットペリックL250(2L・4袋/箱)<排液用バッグ付>	腹膜透析液	院内外				
ミットペリックL400(2L・4袋/箱)	腹膜透析液	院内外				
ミトリンM点眼液(5mL/本)	トピカミド	院内外				
ミトリンP点眼液(5mL)	トピカミド	院内外				
ミニキャップ接続チューブ<2、T5C4482>		院内外				
ミニキャップ接続チューブ<2、T5C4484>		院内外				
ミリステープ(5mg・4.05cm×4.05cm/枚)	ニトログリセリン	院外のみ	内			
ムコフイリン吸入液20%(2mL/包)	アセチルシステイン	院内	内外			
メイロン(8.4%・20mL/管)注	タナクサインナトリウム	院外のみ				

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハイリスク薬
メサテームクリーム(5g)	デキサメタゾンクリーム	院内外				
メサテームクリーム【100g】	デキサメタゾンクリーム	院外のみ				
メサテーム軟膏(5g)	デキサメタゾン	院外のみ				
メサジソン注腸(1g/個)	メサジソン	院内外				
メスルーキャップ		院外のみ				
メノエイトコンヒパッチ	エストラジオール・酢酸ノルエチステロン	院外のみ				
メプシンエア- 10μg吸入100回	ブロカテロール	院外のみ				
メプシンキットエア- 5μg吸入100回	ブロカテロール	院内外				
メプシンシングルヘラー(10吸入100回/キット)	ブロカテロール	院外のみ				
メプシン吸入液ユニット(0.3mL/個)	ブロカテロール	院内外				
メンタックス液(10mL)	ブテナフィン	院外のみ				
モイゼル軟膏(10g/本)【1%】	ジファミラスト	院内外				
モイゼル軟膏0.3%(10g/本)	ジファミラスト	院内外				
モーラステープ 20mg(7×10cm・7枚/袋)	ケトプロフェン	院内外				
モーラステップ 30mg(10cm×14cm【7枚】/袋)	ケトプロフェン	院内外				
ユベラ軟膏	トコフェロール・ビタミンA油	院外のみ				
ラケテック注(500mL/瓶)		院外のみ				
ラシックス(20mg/2mL/管)注	フロセミド	院外のみ				
ラタノプロストPF点眼液0.005%(2.5mL)「日点」	ラタノプロスト液	院外のみ	内外			
ラタノプロスト点眼液0.005%(2.5mL/本)	ラタノプロスト	院内外				
ラパリムゲル0.2%(10g)	シロリムス	院内外	内			
ラピフォートワイプ 2.5%(62.5mg/包)	グリコピロウムトシル酸塩水和物	院外のみ				
ラミシルクリーム 1%(10g)	テルビナフィンクリーム	院内外				
ラミシル外用液 1%(10g)	テルビナフィン	院内外				
ラントスXR注シロスター-(450U/1.5mL/キット)	インスリン グルキノン	院内外	内			Hi
リザベン点眼液 0.5%(5mL)	トラネラスト	院内外				
リティンパ 耳科用(250μg/瓶)セット	トラフェルミン	院内	内			
リドカイン・プロロカインクリーム<2.5%>		院内	内外			
リドカインテープ (18mg/枚)	リドカイン	院内	内外			
リドメックスコーワクリーム0.3%(5g)	プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル	院外のみ				
リドメックスコーワ軟膏0.3%(5g)	プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル	院外のみ				
リドメックスローション0.3%(10g)	プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル	院外のみ				
リハビックスK1号(500mL/袋)注		院外のみ				
リハビックスK2号(500mL/袋)注		院外のみ				
リファジン・ゲンタシン軟膏		院内	内外			
リファンピシン軟膏2%		院内	内外			

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハイリスク薬
リレンザ 吸入(5mg×4BL/枚)	ザナミビル水和物	院外のみ				
リンデロン DP 軟膏(5g)	ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	院外のみ				
リンデロン V クリーム0.12%(5g)	ベタメタゾン吉草酸エステル	院内外				
リンデロン V 軟膏0.12%(5g)	ベタメタゾン吉草酸エステル	院内外	内			
リンデロン VG ローション(10mL)	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン	院外のみ				
リンデロン VG 軟膏0.12%(5g)	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン	院外のみ				
リンデロンA液【点眼・点鼻用】(5mL)	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム・フラジリル	院内外				
リンデロン-Vローション(10mL)	ベタメタゾン吉草酸エステル	院内外				
リンデロン坐剤(1mg)	ベタメタゾン	院外のみ				
リンデロン点眼・点耳・点鼻液 0.1%(5mL)	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	院外のみ				
リン酸Na補正液(0.5mmol/mL・20mL/管)注	リン酸Na補正液	院外のみ				
ルコナック爪外用液5% (3.5g/4mL)	ルリコナゾール	院外のみ				
ルティナス錠(100mg)	プロゲステロン	院外のみ				
ルビアル坐剤(25mg)	フェナルビタルナトリウム	院内外			三種	
ルビアル坐剤【50mg】	フェナルビタルナトリウム	院内外			三種	
ルミガン点眼液 0.03%(2.5mL)	ビマトプロスト	院外のみ				
ルリケールVG軟膏 0.12%(5g)	ベタメタゾン吉草酸・ゲンタマイシン	院内外				
ルリコンクリーム1%(10g)	ルリコナゾール	院内外				
レキユニール LCa 1.5 シングル(2.5L④)	腹膜透析液	院内	内			
レキユニール LCa 2.5 シングル(2.5L④)	腹膜透析液	院内	内			
レキユニール LCa 4.25 シングル(2.0L④)	腹膜透析液	院内	内			
レクタブル注腸フォーム(2mg/回・14回/瓶)	ブテゾニド	院内外	内			
レダコートクリーム(5g)	トリアミノロンアセトド	院外のみ				
レダコート軟膏(5g)	トリアミノロンアセトド	院外のみ				
レバステイブ 皮下注用(3.8mg/瓶)	テデュグルフト(遺伝子組換)	院内外	内外			
レバミル注フレックスペン(300U/3mL/筒)	インスリンデテミル	院内外				Hi
レバミル注ペンフィル(300U/3mL/筒)	インスリンデテミル	院内外	内			Hi
レボフロキサシン点眼液 (0.5%) (5mL)	レボフロキサシン	院内外				
レルベア100エリプタ(14吸入/キット)	ビランテロール・フルチカゾン	院外のみ				
ロキソニンテープ (10cm×14cm・7枚/袋)【100mg】	ロキソプロフェンナトリウム	院外のみ	内外			
ロコイド クリーム0.1%(5g)	ラクサンビド ロコルチゾン	院内外				
ロコイド 軟膏0.1%(5g)	ラクサンビド ロコルチゾン	院内外				
ロゼックスゲル0.75%(50g/本)	メトニダゾール	院外のみ				
亜硝酸アミル(0.25mL/管)吸入薬	亜硝酸アミル	院内	内外			
塩化Ca補正液(1mEq/mL・20mL/管)	塩化カルシウム	院外のみ				
塩化アルミニウム液 20%(100mL)		院内	内外			

薬品名	成分名	採用区分	限定	麻薬	向精神薬	ハイリスク薬
塩化ナトリウム(10%・20mL/管)注	塩化ナトリウム	院外のみ				
塩化ナトリウム注(10%・20mL/管)	塩化ナトリウム	院内外	内外			
含嗽用ハチアス ^レ (2g/包)	アズ ^レ レニスルホンナ ^{Na}	院内外				
強力ポ ^ス テリザ ^ン 軟膏(2g)	ダ ^イ ヨウキンシ ^ン	院外のみ				
強力レスタミンコーチゾ ^ン コーワ軟膏(10g)	サクサンビト ^ロ コルゾ ^ン	院内外				
鼓膜麻酔液(50mL/瓶)		院内				
交換キット延長チューブ ^{＜テルモ5＞}		院内外				
高張食塩水点眼液 5%(5mL)	塩化ナトリウム	院内				
少液量UVゆめセット 4パック ^{用<10>}		院内外				
消毒用エタノール(500mL)	エタノール	院内外				
笑気ガス	アサンカチツ	院内				
蒸留水(注射用)(100mL/瓶)	注射用水	院外のみ				
蒸留水(注射用)(1L/袋)	注射用水	院外のみ				
蒸留水(注射用)(20mL/管)	注射用水	院外のみ				
親水クリーム	親水クリーム	院内外				
生食注シリンジ「NP」≪ロクタイア ⁷ ≫ 【20mL/筒】	生理食塩液	院内外				
生理食塩液(20mL/管)<吸入等>	生理食塩液	院内外				
生理食塩液(20mL/管)<洗浄用>	生理食塩液	院内外				
生理食塩液(広口開栓)(1000mL/瓶)	生理食塩液	院外のみ				
生理食塩液(広口開栓)(1000mL/瓶)	生理食塩液	院外のみ				
生理食塩液(広口開栓)(1000mL/瓶)<洗浄用>	生理食塩液	院外のみ				
生理食塩液(細口開栓)(500mL/瓶)<吸入等>	生理食塩液	院内外				
生理食塩液(細口開栓)(500mL/瓶)<洗浄用>	生理食塩液	院内外				
生理食塩液注 ★(250mL/袋)	生理食塩液	院外のみ				
生理食塩液注(100mL/瓶)	生理食塩液	院内外				
生理食塩液注(1L/袋)	生理食塩液	院外のみ				
生理食塩液注(20mL/管)	生理食塩液	院外のみ				
生理食塩液注(500mL/袋)	生理食塩液	院外のみ				
生理食塩液注(50mL/瓶)	生理食塩液	院内外				
生理食塩点眼液(5mL/本)	生理食塩液	院内	内外			
発汗テスト液(ミノール氏液)(100mL)		院内	内外			
滅菌精製水(1000mL)	精製水	院内外				
滅菌墨汁(5mL/瓶)		院内	内外			
硫酸Mg補正液(1mEq/mL/・20mL/管)	硫酸マグ ^ネ シウム	院外のみ				