

# 国立成育医療研究センター 入院診療計画書 尿道下裂修復術を受けられる患者様用

@PATIENTWARD (@PATIENTROOM)

ID @PATIENTID

患者名 @PATIENTNAME

生年月日 @PATIENTBIRTH 性別 @PATIENTSI

担当医師 @PRIMARYDOCTOR

担当看護師

年 月 日以下の説明を受けました。

本人・家族サイン

病名 尿道下裂

症状 尿道下裂

	入院1日目	入院2日目(手術当日)	入院3~4日目	入院5日目以降	入院9日目	入院10日目
治療/ 処置	外来にて ・血液検査 ・胸部レントゲン検査 ・麻酔科診察 があります	( )時座薬を挿入もしくはお薬を飲みます 浣腸をします 手術後点滴をします 手術後のお薬は、手術の終了時間により、 お昼または夕方から飲みます	お薬を飲みます 点滴を続けます 便が出ない場合、 浣腸をします	お薬を飲みます お昼で点滴は終わります 便が出ない場合、 浣腸をします	朝、おしっこの管を 抜きます 傷のテープを剥がし ます 薬を塗ります	
活動	病棟内は自由です	座薬を挿入または、お薬を飲みましたら、 ベッドにいて下さい 手術後はベッド上安静です 腹圧がかかるようなことはしないようにして下さい 手術後、痛みがあれば痛み止めの薬を使用します	ベッド上安静です	ベッド上安静です 足は動かせるようにな ります	おしっこの管が抜け た後は、病棟内を自 由に動けます	
食事	お昼より病院の 一般食がでます	<術前> ・朝からお食事はありません 午後手術の場合は水分摂取はできます ( )時のお茶( )ml手術前最後です ・ミルク又は母乳を飲んでいる方は ミルク又は母乳を( )時頃( )ml 糖水又はお茶が( )時頃( )mlが最後です <術後> お茶などを飲んで吐かなければお食事が始まります お茶( )時頃( )ml ミルク( )時頃( )ml 食事( )時頃		点滴が抜けた後は 水分をしっかり摂っ て下さい		
清潔	お風呂に入れます		体を拭きます	体を拭きます	おしっこの管が抜け た後、シャワーがで きます	
説明/ 指導	病棟内の説明をします 手術の時間をお知らせします 薬剤師からお薬の説明があります 褥瘡対策に関する計画の必要性 について評価します 特別な栄養管理の必要性につ いて評価します 手術同意書・麻酔同意書を頂 きます	手術の後、医師からお話があります			おしっこが出れば退 院の許可が出ます	次回外来日 /

