

口蓋裂の手術を受ける患者さん (入院診療計画書)

患者ID: 性別: 生年月日: 病棟: 病室:

患者氏名: 病名: 口蓋裂 症状: 口蓋裂を認めます

入院日:

経過	入院日	手術日 (ICU退室まで)	
	1900/1/0	1900/1/1	~ 1900/1/2
		手術前	手術後 (ICU)
患者目標	<ul style="list-style-type: none"> 入院、手術の準備をします 転倒、転落しません 	手術前の準備をします	手術した部位の安静を保ちます
治療 ・ 処置	外来で、麻酔科診察があります	<ul style="list-style-type: none"> () 時 坐薬を挿入します () 時 お薬を飲みます 	<ul style="list-style-type: none"> 手術後はICUに入室し全身管理を行います 鎮静(眠った状態)・挿管・人工呼吸器管理となります
活動	病棟内、自由です	坐薬を挿入またはお薬を飲んだ後は、ふらつくことがあります。危ないのでベッド上で過ごして下さい。	<ul style="list-style-type: none"> ベット上安静です 点滴、モニターなどが抜けないように注意し、場合によっては抑制をすることがあります
食事	通常通り食べられます	<ul style="list-style-type: none"> 朝食はありません () 時のお茶() mlが手術前最後です ミルク又は母乳を飲んでいる方 ミルク又は母乳を() 時まで() ml、 水またはお茶が() 時まで() mlが最後です 	<ul style="list-style-type: none"> 呼吸状態が安定するまで、食事などはとれません 呼吸が落ち着いたら食べたり飲んだりを再開します
清潔	シャワーに入れます		<ul style="list-style-type: none"> 手術の日なのでシャワー、体拭きはありません 手術翌日は体拭きを行います
説明 ・ 指導	<input type="checkbox"/> 病棟の説明をします <input type="checkbox"/> 同意書をお預かりします <input type="checkbox"/> 手術時間をお伝えします(手術ありの場合。無しなら削除)	<input type="checkbox"/> お時間までに病室にお越しください 午前、手術室に入室の方 : 8時 午後、手術室に入室の方 : 11時	
「栄養管理/ 褥瘡対策」 要判断	<input type="checkbox"/> 特別な栄養管理の必要性	<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> X </div>	実施有無: <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 日程:
	<input type="checkbox"/> 褥瘡対策に関する計画の必要性		内容:
メモ:			

2022/2/28 作成
2025/2/10 改訂

口蓋裂の手術を受ける患者さん (入院診療計画書)

患者ID: 性別: 生年月日: 病棟: 病室:
 患者氏名: 病名: 口蓋裂 症状: 口蓋裂を認めます
 入院日:

経過	術後 2 ~ 3日目 (一般病棟)	術後 4 ~ 6日目 (一般病棟)	術後7日目 (退院日)
	1900/1/3 ~ 1900/1/4	1900/1/5 ~ 1900/1/7	1900/1/8
患者目標	手術した部位の安静を保ちます	<ul style="list-style-type: none"> 手術した部位の安静を保ちます 軟らかい食事を食べたり、ミルクを飲みます 	食事を食べたりミルクを飲むことができ、手術した傷の治りが順調であれば退院します
治療・処置	<ul style="list-style-type: none"> 水分補給のための点滴を行います 唇に軟膏を塗ります 眠っている間はモニターをつけて呼吸の状態を観察します 	<ul style="list-style-type: none"> 軟らかい食事を食べ始めます 眠っている間はモニターをつけて呼吸の状態を観察します 術後4日目に栄養の管を抜きます。栄養の管を抜いた後、飲んだり食べたりできれば点滴も抜きます 	退院前に診察があります 
活動	<ul style="list-style-type: none"> おしゃぶりなどの硬いものを口の中に入れること、指しゃぶりは避けてください 栄養の管や点滴が抜けないように注意します ベッドサイドで抱っこができます 		<ul style="list-style-type: none"> 退院後も手術後3週間は、おしゃぶりなどの硬いものを口の中に入れること、指しゃぶりは避けてください
食事	<ul style="list-style-type: none"> 栄養の管から、白湯・ミルク注入をします 吐き気や嘔吐がなければ、少しずつ量を増やします 	<ul style="list-style-type: none"> 軟らかい食事を食べ始めます ミルクの場合は、手術の傷に負担がかからないようにするため、哺乳瓶の乳首ではなく、シリンジを使って飲みます ストローや金属のスプーンは使用しないでください  	<ul style="list-style-type: none"> 入院中と同じように軟らかい食事を食べてください。 ミルクの場合は、シリンジを使ってミルクを飲んでください
清潔	体拭きを行います	シャワーに入れます	退院後は、入浴可ですが、手術後3週間までは長時間の入浴は避けてください。
説明・指導	<input type="checkbox"/> 栄養の管が抜けないう、腕や体の動きを制限するための固定具を使用します <input type="checkbox"/> 指しゃぶりをしないよう、腕の動きを制限するための固定具を使用します	<input type="checkbox"/> 院内の売店で、シリンジを購入してください <input type="checkbox"/> シリンジでミルクを飲ませる方法をご家族に説明し、練習していただきます <input type="checkbox"/> 指しゃぶりをしないよう、腕の動きを制限するための固定具を使用します	<input type="checkbox"/> 次回外来日をお知らせします <input type="checkbox"/> 忘れ物がないかスタッフと共に確認します 

主担当医氏名: 印 主担当医以外の担当者: _____

(注)上記の内容・期間は現時点で考えられるものであり、今後状態の変化に応じて変わることが考えられます。

 年 月 日 上記の説明を受けました。 患者・家族サイン: _____ (続柄) _____

2022/2/28 作成
2025/2/10 改訂