



SOKA University



国立研究開発法人
国立成育医療研究センター
National Center for Child Health and Development

令和 8 年 10 月 16 日

報道関係者各位

学校法人東北医科薬科大学
学校法人創価大学
国立成育医療研究センター

タンパク質の糖鎖欠損が疾患につながる仕組みを解明

－ 未診断疾患の遺伝子バリエーションから病気の原因を探る －

【発表のポイント】

- ・遺伝子のバリエーション情報は急速に蓄積している一方、その多くは病気との関連性が明らかになっていない。
- ・遺伝子のバリエーションによって、タンパク質の「糖鎖」が失われ、機能が損なわれることで病気につながる可能性のある症例を見い出した。
- ・脱リン酸化酵素 ACP3 で糖鎖が失われると、酵素の働き・タンパク質の安定性・細胞外への分泌が損なわれ、神経の発達に障害が生じる可能性が示された。

【概要】

東北医科薬科大学 分子生体膜研究所の真鍋 法義 講師と山口 芳樹 所長・教授らの研究グループは、創価大学 糖鎖生命システム融合研究所の西原 祥子 所長、国立成育医療研究センター ゲノム医療研究部の要 匡 部長、名古屋大学 糖鎖生命コア研究所の古川 潤一 教授、杏林大学の秋元 義弘 教授らと共同で、原因不明の病気（未診断疾患）の患者さんの遺伝子データを解析し、病気の原因を探る研究を進めています。

今回、国立成育医療研究センターに集められた 600 万を超える未診断疾患のゲノムの変化（バリエーション¹）データの中から、タンパク質の「糖鎖」という目印に影響を与える遺伝子のバリエーションを見つけ出しました。さらにその中から、体内でリン酸をはずす働きをする酵素 ACP3 に注目して詳しく調べたところ、このバリエーションによって糖鎖が失われると、酵素としての働きやタンパク質としての安定性、細胞外への分泌が損なわれ、病気につながっている可能性があることを明らかにしました。

この研究成果は、2026 年 10 月 16 日、米国の学術出版社 Cell Press が発行する科学雑誌 iScience に掲載されました。本研究は AMED（国立研究開発法人日本医療研究開発機構）の難治性疾患実用化研究事業（課題管理番号 22ek0109446、24ek0109760、25ek0109815、26ek0109886）および科研費（26K02160）の支援を受けて行われました。

【研究背景】

近年、遺伝子解析技術の進歩により、非常に多くの遺伝子バリエーションの情報が蓄積されています（図 1）。しかし、その中で、「病気の原因になる」のか「影響がない」のかははっきりわかっているものは半数に満たず、半数以上の遺伝子バリエーションは意義が不明なままです。

遺伝子バリエーションの中には、タンパク質を構成するアミノ酸を変化させてしまう「ミスセンス変異²」と呼ばれるものがあり、これがタンパク質の立体構造や、蛋白質に付け加えられる「糖鎖」という目印に影響を与えることが知られています。意義不明のバリエーションが病気の原因であると突き詰めることができれば、新たな治療法の開発につながる可能性があります。




図 1 遺伝子バリエーションの分類と年次推移

遺伝子バリエーションには、健常な人にもみられ影響のないものと、病気の原因となるものがありますが、報告されているバリエーションの多くは、そのどちらにも判定されておらず「意義不明」に分類されています。こうしたバリエーションについて、病気との関わりを一つひとつ評価することが正確な診断や病気の理解、そして治療法の開発につながります。

【研究内容】

私たちは、まず国立成育医療研究センターに蓄積された 600 万を超える未診断疾患のバリエーションデータの中から、糖鎖修飾に異常をもたらすと考えられるミスセンス変異（バリエーション）を絞り込みました。その中から、リン酸をはずす酵素 ACP3 の 335 番目のアミノ酸（トレオニン）がメチオニンに置き換わったバリエーション（T335M）をもつ 3 名の患者さんに着目しました。このバリエーションが生じると、ACP3 の 333 番目のアスパラギンに本来付くはずの糖鎖が失われます。3 名の患者さんはいずれも神経発達に異常が見られたことから、私たちはこの糖鎖の欠損が病気の原因になっているのではないかと考え、詳しい解析を進めました。

そこで、正常な（野生型）ACP3 と、糖鎖が欠損するように改変した ACP3 を、細胞に作らせた組換えタンパク質³として用意し、酵素としての働き、細胞内での存在場所、タンパク質の壊れにくさ（プロテアーゼ抵抗性試験⁴）、そして質量分析計⁵による糖鎖の構造解析など、さまざまな角度から比較しました。

その結果、患者さんに共通する T335M バリエーションでは、野生型に見られる糖鎖修飾が失われていることを確認しました。このバリエーションを持つ ACP3 は、細胞の外（培養液中）へほとんど分泌されず、細胞内にとどまっていました。詳しく調べると、タンパク質を細胞外へ送り出す通り道であるゴルジ体⁶にたどり着けず、その手前にある小胞体⁷にとどまっていることが分かりました。さらに、細胞内にとどまったこのタンパク質は、本来の酵素としての活性をほとんど失っていました。壊れにくさを調べる実験でも、野生型に比べて壊れやすく、立体構造が不安定になっていることが示されました。

また、質量分析計による解析から、このバリエーションで失われる糖鎖は「高マンノース型糖鎖⁸」と呼ばれるタイプだけであることが分かりました。一方、ACP3 の他の糖鎖が付く部位では、「複合型糖鎖⁹」と呼ばれる別のタイプの糖鎖が大部分を占めていました。

また、分子動力学シミュレーション¹⁰というコンピューター計算の手法を用いて、糖鎖が ACP3 の立体構造に与える影響を解析しました。その結果、333 番目のアスパラギンに付く高マンノース型糖鎖は、周囲のアミノ酸と安定した結合（水素結合）のネットワークを作り、ほとんど動かない「支え」のような役割を果たしていることが分かりました。この結果は、Asn333 の糖鎖が ACP3 の構造を支える「構造的なクランプ（留め具）」として働いていることを示しています。

以上の結果から、患者さんに共通してみられた ACP3 の T335M バリエーションは、糖鎖修飾の異常によって構造の安定性が低下し、酵素としての働きの喪失や細胞外への分泌障害を引き起こすことが明らかになりました。特に、高マンノース型糖鎖が ACP3 の構造を安定に保つうえで重要な役割を果たしていることが示唆されます。こうした分子レベルの変化が、患者さんにみられる神経症状の発症に関わっていると考えられます（図 2）。




図2 ACP3 の T335M バリエントが神経発達の障害につながる仕組み（推定）

T335M バリエントによって 333 番目のアスパラギンへの糖鎖修飾が失われた結果、ACP3 が小胞体内にとどまって凝集し、立体構造が不安定になるとともに、リン酸をはずす酵素としての働きを失う可能性が示されました。

【今後の展望】

今回の研究では、ACP3 の T335M バリエントをもつ患者さんを対象としましたが、修飾糖鎖の異常が病気の原因になっている可能性のある変化（バリエント）は、他にも 1,000 種類以上見つかっています。これらについても病気との関係の一つひとつ明らかにしていくことが、将来的な治療法の提案につながると考えられるため、今後も解析を続けていきます。

【論文名】

タイトル : Loss of the Asn333 high-mannose *N*-glycan impairs ACP3 folding and drives disease-associated dysfunction

（日本語名） : ACP3 の高マンノース型 *N*-結合型糖鎖の喪失は、適切な立体構造形成を阻害し、疾患につながる機能障害を引き起こす

掲載紙 : iScience

著者：Noriyoshi Manabe¹, Kazuyoshi Itoh², Shiho Ohno¹, Ayumi Miura¹, Aika Miyata¹, Sora Yashima¹, Sachiko Komatsu³, Tsutomu Fujimura³, Hisatoshi Hanamatsu⁴, Jun-ichi Furukawa⁴, Kiyohiko Angata², Akira Togayachi², Kiyoko F. Aoki-Kinoshita^{2,4}, Yoshihiro Akimoto⁵, Tadashi Kaname⁶, Shoko Nishihara², and Yoshiki Yamaguchi¹

著者所属：¹東北医科薬科大学・分子生体膜研究所、²創価大学・糖鎖生命システム融合研究所、³東北医科薬科大学・薬学部、⁴名古屋大学・糖鎖生命コア研究所、⁵杏林大学・医学部、⁶国立成育医療研究センター

【用語説明】

¹ バリエント：DNA の配列に生じた個人差や変化のこと。病気の原因になるものもあれば、体に影響を与えないものもある。

² ミスセンス変異：遺伝子の変化によって、タンパク質を構成するアミノ酸の一つが別のアミノ酸に置き換わってしまう変異。

³ 組換えタンパク質：遺伝子进行操作して細胞に目的のタンパク質を作らせることで、人工的に得られるタンパク質。

⁴ プロテアーゼ抵抗性試験：タンパク質を分解する酵素(プロテアーゼ)に対する分解されにくさを調べることで、タンパク質の立体構造がどれだけ安定かを評価する実験。

⁵ 質量分析計：分子の質量を精密に測定する装置。タンパク質や糖鎖の構造を調べるために用いられる。

⁶ ゴルジ体：細胞の中で、タンパク質に付いた糖鎖を加工し、細胞外へ送り出す準備を行う細胞小器官。

⁷ 小胞体：細胞の中でタンパク質が作られ、正しい立体構造に折りたたまれる細胞小器官。うまく折りたたまれなかったタンパク質は、ここにとどまる。

⁸ 高マンノース型糖鎖：マンノースという糖が多数連なった、比較的単純な構造の糖鎖。タンパク質が作られる初期の段階でみられる。

⁹ 複合型糖鎖：高マンノース型糖鎖がゴルジ体で加工されることでできる、より複雑な構造を持つ糖鎖。

¹⁰ 分子動力学シミュレーション：コンピュータ上で原子や分子の動きを物理法則にもとづいて計算し、タンパク質などの立体構造の変化を再現する解析手法。

【本件に関するお問い合わせ先】 (研究に関すること) 東北医科薬科大学 分子生体膜研究所・ 薬学部 糖鎖構造生物学教室 教授 山口 芳樹 TEL：022-727-0208 E-mail：yyoshiki@tohoku-mpu.ac.jp	(取材に関すること) 東北医科薬科大学 学務部 入試・広報課 担当：長谷川 (はせがわ)、 片岡 (かたおか) TEL：022-727-0358、022-727-0363 (直通) E-mail：koho@tohoku-mpu.ac.jp
--	---

	創価大学 企画部 企画広報課 担当：岩城（いわき） TEL：042-691-9442（ext. 2622） MAIL：iwaki@soka.ac.jp 国立成育医療研究センター 企画戦略局 広報企画室 担当：神田（かんだ）、 村上（むらかみ） TEL：03-3416-0181（代表） E-mail：koho@ncchd.go.jp
--	---